



№ 27 / 2 Μαΐου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

(*Prays oleae* Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae)

- Η πτήση των ενήλικων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
- Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση εναντίον των προνυμφών που προσβάλλουν τα άνθη, αφού ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική καρπόδεση.
- Συνιστάται επέμβαση με *Bacillus thuringiensis* και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 % ζάχαρης το χρονικό διάστημα **9-11 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές και 14-16 Μαΐου για τις όψιμες-ορεινές περιοχές στις εξής περιπτώσεις:**
 - Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς.
 - ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.
- Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας (*Palpita unionalis* Hübner, Lepidoptera: Pyralidae).

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη