

**№ 6 / 27 Μαρτίου 2013**Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ****Α. ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (*Cacopsylla* sp., Homoptera: Psyllidae)**

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του σπωρώνα επιλέγοντας 25 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία αυγών ή προνυμφών.

- Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών στο **5%** των ανθοδεσμών ή **λιγότερο**, να γίνει επέμβαση με θερινό λάδι λίγο πριν την άνθηση.
- Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε **περισσότερο από 5%** των ανθοδεσμών, να γίνει επέμβαση
 - λίγο πριν την άνθηση με θερινό λάδι και εγκεκριμένο πυρεθροειδές εντομοκτόνο **ή**
 - κατά το χρονικό διάστημα 12-20 Απριλίου με fenoxycarb (εμφάνιση σταγόνας μελιτώματος στην ταξιανθία) **ή**
 - μετά την πτώση των πετάλων με θερινό λάδι και abamectin

Β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (*Erwinia amylovora* Burrill Winslow et al.)

Συνιστάται η προστασία των ανοιγμένων λουλουδιών, όταν η μέση θερμοκρασία ξεπερνάει τους 18,3°C και αναμένεται βροχή ή η σχετική υγρασία ξεπερνάει το 60%.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: laminarin, aureobasidium pulluans (Blossom Protect).

ΣΗΜ: Από την άνθηση και μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να επιθεωρείτε τα κτήματα και να αφαιρείτε και να καίτε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Οι τομές πρέπει να γίνονται 50 - 60 εκ. κάτω από το ορατό σύμπτωμα και **πάντα με ξηρό καιρό**. Επίσης να αφαιρείτε τους ταχυφύεις και τα παραβλάσταρα. **ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΕ** τα εργαλεία με εμβάπτιση σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% για 2 - 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε δένδρο. Μετά το τέλος των εργασιών να πλένετε και να λαδώνετε τα εργαλεία, διότι η χλωρίνη είναι ισχυρό οξειδωτικό.

**Γ. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (*Venturia inequalis* Cooke Wint.)
ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (*Venturia pirina* Aderhold)**

Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση. Συνιστάται η προστασία των δένδρων με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα (**OXI χαλκούχα**), στο 70 – 90% της «πτώσης των πετάλων».

Δ. ΑΦΙΔΕΣ (*Aphis pomi* πράσινη αφίδα μηλιάς, *Dysaphis plantaginea* ρόδινη αφίδα μηλιάς)

Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος 10 βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από 10 τυχαία δένδρα.

Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα *Aphis pomi* ή πάνω από 2 άτομα *Dysaphis plantaginea* να γίνει επέμβαση με αφιδοκτόνο σκεύασμα (μπορεί να συνδυαστεί με τον ψεκασμό για το Φουζικλάδιο).

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη