

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Δελτίο Ν^ο1

(Φουζικλάδιο - Ωίδιο - Βακτηριακό κάψιμο)

(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Έναρξη άνθησης



Άνθηση



Πτώση πετάλων - Καρπόδεση



Νεαρό καρπίδιο

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Έκπτυξη ματιών



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη κορυφή



Έναρξη άνθησης

Τα βλαστικά στάδια ποικίλουν ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή.
Γενικά, στο οροπέδιο Λασιθίου, τα κυρίαρχα βλαστικά στάδια είναι:

- η έκπτυξη ματιών - πράσινη κορυφή στις μηλιές,
- η έναρξη άνθησης - άνθηση στις αχλαδιές.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Στις μηλιές οι πρώτες μολύνσεις απαιτούν βροχές ενώ στις αχλαδιές αρκούν οι έντονες δροσιές.
- Η κρίσιμη περίοδος για τις πρώτες μολύνσεις είναι από την έκπτυξη της βλάστησης μέχρι το στάδιο του καρπιδίου.

Οδηγίες :

- Εφόσον προβλέπεται βροχή συνιστάται ψεκασμός, σε μηλιές και σε αχλαδιές, πριν (να προτιμούνται προληπτικά) ή το συντομότερο δυνατόν μετά από τη βροχή (με διεσδοτικά).
- Στις αχλαδιές να γίνονται ψεκασμοί και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές.

ΩΙΔΙΟ :

(Μηλιά)
(*Oidium farinosum*)



Γενικές πληροφορίες :

- Το μόλυσμα υπάρχει μέσα στα μάτια και ξεκινά με την βλάστηση.
- Το κλίμα της Κρήτης ευνοεί την ασθένεια.
- Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη όλη την καλλιεργητική περίοδο ενώ οι καρποί προσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο.
- Η πρόωμη αντιμετώπιση του ωιδίου περιορίζει σημαντικά τις προσβολές σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

Στις μηλιές να γίνει προστασία για το ωίδιο.

Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :

(*Erwinia amylovora*)
(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Το βακτήριο προκαλεί ζημιές με οικονομική σημασία στις αχλαδιές.
- Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.
- Η ασθένεια ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση. Το βακτήριο μεταφέρεται κυρίως με τον άνεμο, τα έντομα και τα εργαλεία.

Οδηγίες :

Κατά την ανθοφορία: Προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες.

Μετά την καρπόδεση: Τακτικός έλεγχος στις αχλαδιές.

Τα ύποπτα τμήματα με συμπτώματα σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς (σαν να είναι "καμένα" από φωτιά), με ξηρό καιρό, αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών και καταστρέφονται άμεσα. Το βακτήριο μεταδίδεται με τα εργαλεία αφαίρεσης και γι' αυτό καλό είναι να απολυμαίνονται τακτικά με οινόπνευμα του εμπορίου.

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 11 Απριλίου 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη