

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος

Τηλέφ.: 2421066525-Fax : 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες : Φωτοπούλου Αννέτα

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 3/ 8-4-2014

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (*Eurytoma Amygdali*)

Το ευρύτομο είναι ο σημαντικότερος εχθρός της Αμυγδαλιάς διότι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη απώλεια της παραγωγής. Μοιάζει με μαύρο φτερωτό μυρμήγκι. Διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη μέσα στα προσβεβλημένα Αμύγδαλα, που συνήθως παραμένουν μουμιοποιημένα στο δένδρο. Έχει μία γενεά το έτος.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις σε εντομολογικούς κλωβούς υπαίθρου διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται η έξοδος των ακμαίων του ευρύτομου στις πρώιμες και όψιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας και Λάρισας. Έναρξη εξόδου των ακμαίων του ευρύτομου στις περιοχές Κανάλια, Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου (με 1-3, ακμαία ανά κλωβό). Έναρξη εξόδου του ευρύτομου στις περιοχές Δαμάσι και Δομένικο του Ν.Λαρισας πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου (με 6 ακμαία ανά κλωβό).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνει έναρξη των ψεκασμών για την καταπολέμηση των ακμαίων του ευρύτομου στις όψιμες περιοχές του Ν. Μαγνησίας (Όπως Κανάλια, Ριζόμυλο, Στεφανοβίκειο) και του Ν. Λάρισας (όπως Δαμάσι, Δομένικο κ.λ.π). Επανάληψη των ψεκασμών στις πρώιμες και όψιμες περιοχές ανά 7-8 ημέρες μέχρι και την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας, που έχουμε την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, διότι τότε έχουμε τη μεγαλύτερη έξοδο των ακμαίων του ευρύτομου. Όταν ο καιρός είναι ομιγλώδης – νεφοσκεπής και κρύος δεν ψεκάζουμε (λόγω μειωμένης δραστηριότητας του εντόμου).

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: *deltamethrin* και άλλα επιτρεπόμενα για την Αμυγδαλιά.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε δραστηριότητα των φυτοπαθογόνων μυκήτων: α) Μονίλια στους κλαδίσκους και τους μικρούς καρπούς της Αμυγδαλιάς και β) Φυτόφθορα στους κλάδους των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνουν ψεκασμοί για την καταπολέμηση τους σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του ευρύτομου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο:

<http://www.minagric.gr/>

Ο Προϊστάμενος Δ/σης α.α.

Δημ. Λύκας