



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

9 / 28-02-13

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



Δ
Λευκή κορυφή



Ε
Οι στήμονες
διακρίνονται



Ζ
Άνθη ανοιχτά



Η
Πτώση των
πετάλων



Θ
Δέσιμο καρπού

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές από τον μύκητα σε οπωρώνες υπερπρώιμων ποικιλιών.
Οι πρώιμες και όψιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση στις όψιμες ποικιλίες και σε οπωρώνες των υπόλοιπων ποικιλιών που υπάρχουν προσβολές.**

Σας υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα για την μονίλια.

Φυτ/κά Βλέπε δελτίο 6/ 6-2-13.

προϊόντα:

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι η προσβολή των οφθαλμών, των φύλλων και των καρπών.

Συμπτώματα: Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμμεος.

Οδηγίες: **Να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.**

ΦΥΤ/ΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Θιράμ, Κάπταν, Μανέμπ, Ντιθιανόν.



Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

- Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια και οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.
- Οδηγίες:** **Άμεση επέμβαση στις όψιμες ποικιλίες και σε οπωρώνες των υπόλοιπων ποικιλιών που υπάρχουν προσβολές.** Σας θυμίζουμε ότι σε όλη την διάρκεια της άνθησης, τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα.
- Φυτ/κά προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 6/ 6-2-13.

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

- Οδηγίες:** Σας επισημαίνουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ' αυτή την περίοδο.
- Φυτ/κά προϊόντα:** *Ζιράμ {ροδακινιά}, Θιράμ {ροδακινιά, δαμασκηνιά}.*

3.ΩΙΔΙΟ(υπερπρώιμες ποικιλίες)

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα βλαστούς και καρπούς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Η ασθένεια είναι πιο συχνή σε πυκνούς οπωρώνες ευπαθών ποικιλιών και σε φυτώρια. **Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.**

- Οδηγίες:** Την κρίσιμη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Να γίνει η πρώτη επέμβαση στις αρχές του σταδίου του σχισίματος του κάλυκα και η επόμενη, μετά την πτώση του κάλυκα και πριν αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα. Σε ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες χρειάζονται επιπλέον επεμβάσεις, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.
- Φυτ/κά προϊόντα:** *Θείον, {Μπουπιριμέιτ μόνο σε ροδακινιά}, Μπασκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, {Πενκοναζόλ, μόνο σε ροδακινιά}, Μυκλομπουτανίλ, Τεμπουκοναζόλ .*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ