



No 20 / 13 Ιουνίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία

ΠΕΛΙΝΕΣ-ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**(*Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)**

- Ξεκίνησε η 2^η πτήση των εντόμων.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής	Οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	20*-23 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	15*-19 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	26-28 Ιουνίου	Methoxyfenozide (3)	7
			Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (2)	14
			Diflubenzuron (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	20*-23 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου	Emamectin (3)	3
			Beta-cyfluthrin (2)	7
			Cyfluthrin (1)	7
			Deltamethrin (2)	7
			Etofenprox (2)	7
			Lambda cyhalothrin (2)	7
			Spinosad (3)	7
			Indoxacarb (3)	10
Chlorpyrifos (2)	20			
Chlorpyrifos-methyl (1)	21			

- * **15-17** και **20-21 Ιουνίου** είναι οι ημέρες επέμβασης για τις **υπερπρώιμες** περιοχές.
- * **17-19** και **22-23 Ιουνίου** είναι οι ημέρες επέμβασης για τις **μεσοπρώιμες** περιοχές.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται μέχρι 20 Ιουνίου δεν απαιτείται επέμβαση.
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.