



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

13/22-03-13

A. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

1. ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες: Στις όψιμες ποικιλίες να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/κά

προϊόντα: *Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.*

B. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Οι μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα. Να συνεχιστεί η προστασία.

Φυτ/κά

προϊόντα: Βλέπε δελτίο 6/ 6-2-13.

2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν σποραδικές προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες:

Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια.

Φυτ/κά

προϊόντα: *Ζιράμ {ροδακινιά}, Θιράμ {ροδακινιά, δαμασκηνιά}.*

2. ΩΙΔΙΟ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.






Οδηγίες:

Την κρίσιμη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Να γίνει η πρώτη επέμβαση στις αρχές του σταδίου του σχισίματος του κάλυκα και η επόμενη, μετά την πτώση του κάλυκα και πριν αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα. Σε ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες χρειάζονται επιπλέον επεμβάσεις, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θείον, {Μπουπιριμέιτ μόνο σε ροδακινιά}, Μπροσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, {Πενκοναζόλ, μόνο σε ροδακινιά}, Μυκλομπουτανίλ, Τεμπουκοναζόλ.

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ**1. ΜΟΝΙΛΙΑ****Βλαστικά Στάδια Κερασιάς**

				
Γ Εμφάνιση ανθοφόρων οφθαλμών	Δ Οι ανθοφόροι οφθαλμοί ξεχωρίζουν	Ε Διακρίνονται οι στήμονες	Ζ Άνθη ανοιχτά	Η Πτώση πετάλων

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες πρώιμων ποικιλιών να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά προϊόντα

Θιράμ, Θιοφανείτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Κάπταν, Μπροσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν, Προχλωράζ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονιλία, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ