

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΑΣΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΛΦΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ												+	Δολωμ.ψεκ.7
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΠΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ												+	Δολωματικοί + καλύψεως 14
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+	καρπόβια										+	Δολωματικοί + καλύψεως 14
ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ + ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+	καρπόβια		+									7
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+											+	-Δολωμ..ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρ. -Ψεκ.καλύψεως 7 ή 120 ημέρ. (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΠΕΤΑ-ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ	+				+				+	+		+	Ψεκ.καλύψ. 56 Δολωμ.ψεκ. 14
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΜΠΟΥΠΡΟΦΕΖΙΝ			+										45
ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ												+	Δολωματικοί + καλύψεως 28
ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ	+	ανθόβια											Μέχρι αρχή άνθησης
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+			+		21
ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ	+											+	2
ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ			+										Πριν άνθηση
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ												+	Δολωμ.ψεκ.14
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ			+										60
ΦΟΣΜΕΤ	+											+	21
ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΩΣ ΜΕΘΥΛ	+		+										60

**Σημείωση :** Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκεύασμα σε συνδυασμό με φερομόνη και ελκυστικό τροφής που επιτυγχάνει μαζική προσέλκυση και θανάτωση του δάκου με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ελιές) -30 (ελαιοποιήσιμες ελιές )
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+			30
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	15
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			Πριν άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΑΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)**

**Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.**

**Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Ιωάννινα, Απρίλιος 2016**