




No 2 / 25 Φεβρουαρίου 2013

Λαίδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία
Υφούλης ΑντώνηςΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΩΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ****Α. ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΩΝ (*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)**

Η Μονιλία προσβάλλει τα άνθη όλων των πυρηνοκάρπων. Η ευαισθησία των διαφόρων τμημάτων καθώς και το στάδιο που πρέπει να καλυφθεί για το κάθε είδος δίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΤΜΗΜΑ	ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ)
Βερικοκιά	Σέπαλα - Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Κόκκινο μπουμπούκι (Στάδιο C)
Κερασιά	Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Λευκή κορυφή (Στάδιο D)
Ροδακινιά & Νεκταρινιά	Ανθήρες - Στίγμα	Ροζ κορυφή έως 5% άνθησης (Στάδιο D – E)
Δαμασκηνιά	Σέπαλα - Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Πράσινη κορυφή (Στάδιο C)



C	D	E	C	D	C
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ			ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Οι βροχοπτώσεις του τρίτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης του μύκητα και καθιστούν την επέμβαση στα παραπάνω στάδια επιβεβλημένη.

Η επέμβαση να διεξαχθεί ακόμα και σε πολύ πρώιμες περιοχές ή και ποικιλίες όπου βρίσκονται πριν την έκπτυξη των οφθαλμών. Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εάν επιλεγεί ή συνδυαστεί χαλκούχο σκεύασμα επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση των **Βακτηριώσεων** (*Pseudomonas spp.*), καθώς και περιορισμός του μολύσματος της Ανθράκνωσης (*Gnomonia erythrostoma*) της Κερασιάς (τα προσβεβλημένα φύλλα παραμένουν στο δένδρο μετά την πτώση των υγιών το φθινόπωρο).

B. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

Συνιστάται επέμβαση στο στάδιο της ροζ κορυφής (D – E) με **θερινά λάδια** εναντίον της Ψώρας του San José (*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae) και της Βαμβακάδας (*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae). Ο ψεκάσμος πραγματοποιείται κατόπιν δειγματοληψίας σε βλαστούς και διαπίστωσης παρουσίας ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό άνω του 20-24%. Η επέμβαση αυτή ελέγχει αποτελεσματικά και τα χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου και τα αυγά αφίδων.

Εάν στην παραπάνω επέμβαση χρησιμοποιηθεί **μισή δόση θερινού λαδιού και προστεθεί ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο** επιτυγχάνεται ταυτόχρονη καταπολέμηση και του Φυλλοδέτη (*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Tortricidae), της Ανάρσιας (*Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και του Βλαστορύκτη (Καρπόκαφα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).

Εγκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής βάσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: (<http://www.minagric.gr/syspest/>)

Μονίλια των πυρηνοκάρπων

	ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Boscalid	✓	✓	✓	✓	✓
Calcium copper sulfate	✓	✓	✓	✓	✓
Captan	✓	✓	✓	✓	✓
Copper hydroxide	✓	✓	✓	✓	✓
Copper oxide	✓	✓	✓	✓	✓
Copper oxychloride	✓	✓	✓	✓	✓
Cyprodinil	✓	✓	✓	✓	✓
Cyproconazole	✓				
Dithianon	✓	✓	✓	✓	✓
Fludioxonil	✓	✓	✓	✓	✓
Iprodione	✓	✓	✓		✓
Prochloraz	✓			✓	✓
Propiconazole	✓	✓	✓		
Pyraclostrobin	✓	✓	✓	✓	✓
Tebuconazole	✓	✓			
Thiophanate-methyl	✓	✓	✓	✓	✓
Thiram	✓		✓	✓	✓
Tribasic copper sulfate	✓		✓	✓	✓
Ziram	✓				

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη