



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

21 / 24-4-13

Α. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

1. ΑΝΑΡΣΙΑ

Οι προνύμφη του εντόμου προσβάλλει βλαστούς και καρπούς της βερικοκιάς, ροδακινιάς νεκταρινιάς και δευτερευόντως της δαμασκηνιάς.

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση της ανάρσιας σε όλες τις περιοχές.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες των παραπάνω πυρηνοκάρπων, των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 1-5 Μάη. Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 10-14 Μάη. Περιοχή Ήρας 1-3 Μάη.**

Φυτ/κά προϊόντα: **Βερικοκιά:** *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), { Δελταμεθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινোসάντ 7 ημέρες }, { Ιντοξακάρμπ 10 ημέρες }, { Χλωραντρανιλιπρόλ 14 ημέρες }.*

Ροδακινιά: *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), { Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν 7 ημέρες }, { Ιντοξακάρμπ 10 ημέρες }, { Χλωραντρανιλιπρόλ 14 ημέρες }, { Χλωρπυριφός μεθύλ 21 ημέρες }, { Χλωρπυριφός 20 και 30 ημέρες ανάλογα με το σκεύασμα }, { Ντιφλουμπενζουρόν, 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή }, { Τα-Φλουβαλινείτ 56 ημέρες }.*

Νεκταρινιά: *Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

Δαμασκηνιά: *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*

2. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Ενδεικτικά σημεία για προσβολή είναι οι λαιμαργοί βλαστοί της βάσης και η αυτοφυής βλάστηση. Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές(περισσότερες από 5 κινητές μορφές στο 10% δείγματος 50 φύλλων) , να γίνει καταπολέμηση. ►

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Βερικοκιά: Άλατα λιπαρών οξέων {0 ημέρες}, {Θερινά λάδια 20-21 ημέρες }, {Ετοξαζόλ, 14 ημέρες }.

Ροδακινιά: Άλατα λιπαρών οξέων {0 ημέρες}, {Θερινά λάδια 20-21 ημέρες }, { Ασεκουινοσίλ, Ετοξαζόλ, Εξιθιαζόξ, Σπιροντικλοφέν 14 ημέρες }, { Πυρινταμπέν 20 ημέρες }.

Νεκταρινιά: Άλατα λιπαρών οξέων {0 ημέρες}, {Θερινά λάδια 20-21 ημέρες }, {Ετοξαζόλ, 14 ημέρες }.

Δαμασκηνιά: {Θερινά λάδια 20-21 ημέρες }.

Β. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

1.ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές από το κοκκοειδές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών ερπουσών .

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επιμελημένος ψεκασμός, με διαβροχή κορμών και βραχιόνων, από 1-5 Μάη

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Ροδακινιά: Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων, { Φενοξικάρμπ, 20 μέρες }, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Νεκταρινιά: Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Δαμασκηνιά: Θερινά λάδια, Χλωρπυριφός.

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ

1.ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες. Με την έναρξη των προσβολών να γίνεται επέμβαση.

**ΦΥΤ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ,, Πιριμικάρμπ, Πυρεθρίνς, Θερινά λάδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς και ροδακινιάς, να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Οι μέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ