

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/σεις Γεωργίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Β-Γ Φούσκωμα ματιού
Πράσινη κορυφή

Δ Έξοδος φύλλων

Ε Πρώτα φύλλα

Ζ Εμφάνιση σταφυλιών

Η Ξεχώρισμα σταφυλιών

Πληροφορίες : Κ. Λίλης – Δ. Πυργιώτη
Θ. Μαρκόπουλος

Τηλ.: 2510 600421 - 422
600420

Αριθ. Δελτίου : 03/08-04-2013

Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ.: 2510/245684

Τηλ.: 2510600421

Σωστή χρήση

φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

ΑΜΠΕΛΙ

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Το αμπέλι βρίσκεται στα βλαστικά στάδια από Β έως Ε, ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία του αμπελιού.

Ι. ΦΟΜΟΨΗ

Η ασθένεια προσβάλλει τους βλαστούς, τα φύλλα και τους βότρες. Κυρίως όμως προσβάλλει την βάση της βέργας και τα πρώτα μεσογονάτια διαστήματα, όπου εμφανίζονται μαύρες νεκρωτικές επιφάνειες. Σε έντονες προσβολές παρατηρούνται σχισμές στη βάση των κληματίδων ή ακόμη και ξηράνσεις αυτών. Η προσβολή γίνεται την άνοιξη κατά την δημιουργία των νέων βλαστών. Οι κλιματολογικές συνθήκες αυτή την περίοδο είναι ιδανικές για την μόλυνση και την εξάπλωση της ασθένειας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνιστάται με το ξεκίνημα της νέας βλάστησης να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ο παραπάνω ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 7 -8 ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπελίες όπου το πρόβλημα είναι έντονο κάθε χρόνο. Θα πρέπει να γίνει ακόμη ένας ψεκασμός μετά από 7-8 ημέρες, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου.

Π. ΩΙΔΙΟ

Η μόλυνση και εξάπλωση της ασθένειας αρχίζει με το ξεκίνημα της νέας βλάστησης και συνεχίζεται μέχρι και σε θερμοκρασίες 30-32°C, με ιδανικές θερμοκρασίες 20-25°C. Προσβάλλει φύλλα, βλαστούς και βότρες. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της



ασθένειας έχει σαν επακόλουθο τη μείωση της βλάστησης, μείωση της παραγωγής και της ποιότητας των σταφυλιών. Θεωρείται μια από τις πιο σοβαρές ασθένειες του αμπελιού στην περιοχή μας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός όταν οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 8-10 εκατοστών με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 10 ημέρες. Ανάλογα με την ένταση της ασθένειας, οι ψεκασμοί μπορεί να επαναλαμβάνονται ανά 10-15 ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου το πρόβλημα είναι έντονο κάθε χρόνο.

ΙΙΙ. ΑΚΑΡΕΑ

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και όταν παρατηρήσουν πληθυσμούς ακάρεων στα πρώτα φύλλα να πραγματοποιήσουν έναν ψεκασμό με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή των ασθενειών αυτών στην αρχή της νέας βλάστησης και να γίνει καλό λούσιμο των πρέμων το οποίο, στο στάδιο αυτό, επιτυγχάνεται με πολύ λιγότερο ψεκαστικό υγρό.
 2. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια όπου οι ασθένειες ήταν έντονες τα προηγούμενα χρόνια.
 3. Επιλέγετε τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τις λίστες των φυτ. προϊόντων που σας αποστέλλουμε και
 4. Να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή