

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Στα πλαίσια αντιμετώπισης θεμάτων φυτοπροστασίας που προκαλούν σημαντικές ζημιές στην παραγωγή και στο εισόδημα των καλλιεργητών και εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου θα εκδίδει στο εξής τεχνικά δελτία για την καλλιέργεια της καστανιάς στο νομό Χανίων.

Τα τεχνικά δελτία καστανιάς εκδίδονται σε συνεργασία με:

- το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων (πληροφ. κ.Καλαϊτζάκη Αργυρώ τηλ.2821083438)
- το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων (πληροφ. κ.Γαβριλάκη Μιχάλη τηλ.2822022005) και
- την "Αναπτυξιακή Εννιά Χωριών" (πληροφ. κ. Ανουσάκης Χαράλαμπος τηλ. 6974405586).



Προνύμφη του *Pammene fasciana*.



Αποχωρήματα της προνύμφης σε νεαρό καρπό (κύπελλο).



Νεαροί καρποί (κύπελλα) μεγέθους 3-5 χιλ., κατάλληλο στάδιο για ψεκασμό.

<p><b>ΣΚΟΥΔΗΚΙ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ:</b> (<i>Pammene fasciana</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Τρόπος και Μέσα επέμβασης:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Είναι μια μικρή νυχτόβια πεταλούδα που προσβάλλει νεαρούς καρπούς λίγο μετά την καρπόδεση (μέγεθος καρπού 3 – 5 χιλιοστά).</li> <li>- Οι νεαροί προσβεβλημένοι καρποί (κύπελλα) πέφτουν πρόωρα (Ιούλιο – Αύγουστο).</li> <li>- Το έντομο στο νομό Χανίων προκαλεί σημαντικές προσβολές με οικονομικές ζημιές κυρίως σε καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.</li> <li>- Στο δίκτυο παρακολούθησης του εντόμου καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί με τις πρώτες συλλήψεις.</li> </ul> <p>Οδηγίες: Για όλους τους παραπάνω λόγους συνιστάται ένας ψεκασμός κάλυψης αμέσως μετά την καρπόδεση και όταν οι νεαροί καρποί (κύπελλα) έχουν μέγεθος 3 – 5 χιλιοστά <b>μόνο</b> σε καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.</p> <p>Τρόπος και Μέσα επέμβασης: Η επέμβαση να γίνεται επιμελημένη και κατευθυνόμενη στους νεαρούς καρπούς με πλήρη κάλυψη του δέντρου με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Εγκεκριμένα για την καλλιέργεια της καστανιάς εντομοκτόνα είναι ορισμένα σκευάσματα με δραστική ουσία <i>deltamethrin</i>, το <i>chlorantraniliprole</i> (<i>Coragen 20 SC</i>) και το <i>lambda cyhalothrin</i> (<i>Karate with Zeon technology 10 SC</i>).</p>
--	---

Ηράκλειο 23 Ιουνίου 2014

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης