

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΥΤΗΣ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΡΥΓΧΙΤΗΣ	ΜΥΤΗΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΛΑ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΑΛΦΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ												+	Δολωμ.ψεκ.7
ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ											+		Μόνο σε επιτραπέζιες ποικιλίες Εφαρμογές στο στάδιο σχηματισμού ανθοφόρων οφθαλμών και κατά την πτώση των πετάλων 28
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ (Βιολογικό)	+												0
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+		+	+			+					+	Δολωματικοί + καλύψεως 7
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ	+	Καρπόβια γενιά										+	- Δολωματικοί+ Καλύψεως για δάκο - Καλύψεως για πυρηνοτρήτη 14
ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ + ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝΗ	+	Καρπόβια γενιά										+	- Δολωματικοί+ Καλύψεως για δάκο - Καλύψεως για πυρηνοτρήτη 14
ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ + ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+	Καρπόβια γενιά		+									7
ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+									+	-Δολωμ..ψεκασμοί για δάκο 7 ημέρ. -Ψεκ.καλύψεως 7 - 120 ημέρες (ανάλογα με το σκεύασμα)
ΜΠΕΤΑ-ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ	+				+				+	+		+	Ψεκ.καλύψ. 56 Δολωμ.ψεκ. 14
ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ (Βιολογικό)												+	0
ΜΠΟΥΠΡΟΦΕΖΙΝ		+	+			+		+			+		Από 50%μεγέθους καρπού έως τον αποχρωματισμό
ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ												+	Δολωματικοί + καλύψεως 28

ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ		+	+			+	+	+			+		21
ΠΥΡΗΠΡΟΞΙΦΕΝ		+	+										Πριν άνθηση
ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ	+ Καρπόβια γενιά												21
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ											+		Δολωμ.ψεκ.14
ΣΠΠΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ		+	+			+							Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης 14
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ			+										60
ΦΟΣΜΕΤ	+										+		Ψεκ.καλύψ. 21
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΩΣ ΜΕΘΥΛ	+		+										60

Σημείωση : Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκεύασμα σε συνδυασμό με φερομόνη και ελκυστικό τροφής που επιτυγχάνει μαζική προσέλκυση και θανάτωση του δάκου με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα ελαιόδεντρα. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης του δάκου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στις ελιές.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, 6 Απρίλιου 2017

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ	+			-Πριν άνθηση (βρώσιμες ποικιλίες) -30 ημ. (ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ *	+			21 (1 μόνον εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο)
ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	+			30
ΝΤΟΝΤΙΝ	+		+	15
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		+	28 (1-2 εφαρμογές μέχρι το 10% του τελικού μεγέθους καρπών την Άνοιξη, και 1 μόνον εφαρμογή το Φθινόπωρο)
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			Από έναρξη βλάστησης έως την άνθηση
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+			14 (max: 2 εφαρμογές / 1 μόνον εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου)
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ	+	+	+	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ	+			21

* Η δραστική ουσία ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στις ποικιλίες
Καλαμών και Κορωνέικη.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, 6 Απριλίου 2017