



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

15 / 6-4-17

ΑΜΠΕΛΙ

1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οδηγίες:

Καλλιεργητικά μέτρα:

- Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρχονται την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
- Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
- Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές.
- Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.
- Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση.

Χημική αντιμετώπιση

Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.)

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

Φυτ/κά προϊόντα:

Αζοξυστρομπίν, Αμετοκτραντίν+Μετιράμ, Ιπροβαλικάρμπ+ Προπινέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ-μ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+χαλκός, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μετιράμ, Μπενθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ+Μανκοζέμπ, Ντιμεθομόρφ + Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ + Φολπέτ, Ντιθιανόν, Ποτάσιουμ Φοσφονείτς, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόν, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+ Φοσετύλ-αλ,

*Συμοξανίλ+Ζοξαμίντ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ,
Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ,
Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ,
Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, Φολπέτ,
Φολπέτ+Μεταλαξύλ+Χαλκός, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ,
Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ,
Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Ιπροβαλικάρμπ,
Χαλκός+Ζοξαμίντ, Χαλκός+Ντιμεθομόρφ.*

2.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο 8/9-3-17.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. **Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. **Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.**
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ