

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής, Ρ.Οικονομάκη

6.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Σ. Λούρου.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ :

Ώσιμες περιοχές: «Κρόκιασμα» των ανθιδίων στις ταξιανθίες, λίγο πριν την άνθηση (στάδιο Ε).

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη)



Στάδιο Ε: Κρόκιασμα.



Στάδιο F: Εναρξη άνθησης.



Στάδιο F1: Πλήρης άνθηση.



Μαργαρόνια: Φαγώματα στην ακραία βλάστηση.



Πυρηνотρήτης: Προσβολή σε κλειστό άνθος.



Βαμβακάδα: Λευκά κηρώδη εκκρίματα στις ταξιανθίες.

Ο Ψ Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ

<p>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (<i>Prays oleae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p> <p>Σύσταση:</p> <p>Ενημέρωση:</p>	<p>Στις όψιμες περιοχές η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλούς πληθυσμούς στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων.</p> <p>– Σε ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν <u>χρειάζεται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς.</u></p> <p>– Ελαιώνες μέτριας ή μειωμένης ανθοφορίας (<50% της κανονικής) έχουν ανάγκη προστασίας από τον πυρηνοτρήτη <u>κατά την έναρξη της άνθησης</u> (από το κρόκισμα έως 25% ανοικτών ανθέων).</p> <p>– Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας για να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς (καρπόβιας). Συστήνεται επανάληψη της επέμβασης σε 7 ημέρες.</p> <p>Περίοδος άνθοφορίας: <i>Bacillus thuringiensis</i>, <i>Beta cyfluthrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Lambda cyhalothrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), <i>Dimethoate</i> (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ.), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ.), <i>Chlorpyrifos methyl</i> (2 εφαρμογές, αναμονή 60).</p> <p>Κατά τη διάρκεια της άνθησης προτείνεται χρήση των μικροβιακών σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας που δεν διαταράσσουν τα έντομα επικονίασης και τα ωφέλιμα (παράσιτα, αρπακτικά).</p> <p>Για τις Π.Ε. Χανίων και Λασιθίου τα δεδομένα των συλλήψεων του εντόμου λαμβάνονται με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων και της Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραμβέλλου Α.Ε.</p>
<p>Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α : (ΨΥΛΛΑ) (<i>Euphyllura phillyrae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p>	<p>Η νεαρή βλάστηση και οι ταξιανθίες καλύπτονται με χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και μελιτώματα. <u>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ψύλλας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται εξάρσεις προσβολών κατά περιοχές.</u></p> <p>– Συστήνεται αντιμετώπιση σε <u>ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και προσβολή που εξαπλώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% των ανθέων.</u></p> <p>Επιλέγοντας εγκεκριμένο σκεύασμα και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.</p> <p>Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 21μ.), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή/ αναμονή 7 ημ.).</p>
<p>Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (<i>Palpita unionalis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p>	<p>Αυτή την περίοδο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση. Οι προνύμφες προκαλούν εκτεταμένα φαγώματα και στοές στα φύλλα και στις βλαστικές κορυφές.</p> <p>– Στις όψιμες περιοχές συστήνεται προστασία των <u>νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.</u></p> <p>Περίοδος άνθοφορίας: <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ.).</p>

▪ Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίστε να τηρούνται αυστηρά για να αποφεύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ηράκλειο 2 Μαΐου 2018
 Η Προϊσταμένη Τμήματος
 Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, κ.ά).