

**№ 16 / 29 Μαΐου 2013**Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ****(*Prays oleae* Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae)**

- Η πτήση των ενήλικων της καρπόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:

	Ελαιώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής ή μέτρια καρποφορία	Ελαιώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής
πρώιμες- παραθαλάσσιες περιοχές	2-5 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν	13-16 Ιουνίου
όψιμες-ορεινές περιοχές	7-10 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν	19-22 Ιουνίου

- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): *Bacillus thuringiensis* spp. Aizawai (2), *Bacillus thuringiensis* var. Kurstaki, Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Deltamethrin (2), Lambda cyhalothrin (2), Pyrethrins (3).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας (*Palpita unionalis* Hübner, Lepidoptera: Pyralidae).

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη