



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

**Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου
ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ**

19/30-4-18

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Οι χθεσινοβραδινές καιρικές συνθήκες δημιούργησαν συνθήκες ελαφριάς μόλυνσης στα μηλοειδή όλων των περιοχών. Εμφάνιση κηλίδων σε 10-12 μέρες.

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε μηλιές και αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Βλέπε δελτίο 10/19-3-18 για μηλιά.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

ΑΧΛΑΔΙΑ

A. Προστατευτική δράση: Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλι και Κόσια) , Μετιράμ, Ντιθιανόν (ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση.

B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Bacillus subtilis strain QST 713, Θειοφανείτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Potassium phosphonates, Ντιφenoκoναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ, Ντιθιανόν+Πυριμεθανίλ Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκoναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+ Τεμπουκoναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιoξoνίλ, Τεμπουκoναζόλ,

Τεμπουκoναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκoναζόλ, Φλουoπυράμ+Τεμπουκoναζόλ, Φλουξαπυροξάντ, Φλουτριάφoλ,
-Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων.
- Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ *Θειοφανείτ μεθύλ* κ.α

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες: **Επιβάλλεται συνεχής έλεγχος των δενδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών. Στα δένδρα που εντοπίζονται προσβολές, τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. (Βλέπε δελτίο 6/1-3-18).**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ