

Να
 κρατηθεί
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της
 Μηλιάς και της Αχλαδιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
acetamiprid ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ			+				+			*	2	14
acrinathrin (έως 20-7-2013) ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ				+			+	+		*	1	28
fatty acid potassium salt ΑΛ. ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ			+	+	+			+		*	4	0
abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+						ΑΧΛΑΔΙΑ	2	10 ή 14 (ανάλογα το
acequinocil ΑΣΕΚΙΝΟΣΥΛ								+		*	1	14
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+						*	2	7
deltamethrin (ετοιμόχρηστο δόλωμα) ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ						+				*	1	
hexuthiazox ΕΞΥΘΙΑΖΟΞ								+		*	1	35
emamectin ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	+									ΜΗΛΙΑ	3	3
etoxazol ΕΤΟΞΑΖΟΛ								+		*	1	28
etofenprox ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	+									ΜΗΛΙΑ	3	7
thiacloprid ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ	+		+				+			*	1	14
thiamethoxam ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ			+							*	2	14
imidacloprid ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΡΙΠΙΝΤ				+						ΑΧΛΑΔΙΑ	1	7
indoxacarb ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ	+									*	3	10

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
virus granulosi ΙΟΙ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ	+									*	9	3
kaolin ΚΑΟΛΙΝ				+						ΑΧΛΑΔΙΑ		Πριν την άνθηση
clothianidin ΚΛΟΘΙΑΝΙΝΤΙΝ			+							*	1	14
clofentezine ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ								+		*	2	45
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ				+			+			*	2	7
methoxyfenozide ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+			*	3	14
milbemectin ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ								+		ΜΗΛΙΑ	2	14
beta-cyfluthrin ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+			*	2	7
ΝΤΟΝΤΕΚΑΤΙΕΝ 1 -ΟΛ (παρεμπόδιση σύζευξης)	+									*	2	3
diflubenzuron ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ	+			+			+			*	4	30
oxamyl ΟΞΑΜΥΛ	Εφαρμογή στο έδαφος πριν τη φύτευση ή γύρω από τα εγκατεστημένα δέντρα και μόνο σε φυτώρια και δέντρα που δεν πρόκειται να καρπίσουν για ένα χρόνο από την εφαρμογή για καταπολέμηση νηματωδών και εντόμων φυλλώματος (αφίδων, φυλλορυκτών και ακάρεων).											
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+			+		*	4	21
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+			+		*	1	Στο λήθαργο
pirimicarb ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ			+							*	2	21
pyridaben ΠΥΡΙΝΤΑΜΠΕΝ								+		ΜΗΛΙΑ	1	20
pyriproxyfen ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ					+					*	1	Πριν την άνθηση
spinosad ** ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ **	+			+			+			*	3	ΑΧΛΑΔΙΑ : 7/14 ΜΗΛΙΑ :7
spirodiclofen ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ								+		*	1	14
cyfluthrin ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+			*	1	7
tebufenozide ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+			*	4	14

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
tebufenpyrade ΤΕΜΠΙΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ								+		*	1	21
fenoxycarb ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ	+			+	+		+			*	2	ΜΗΛΙΑ:20 ΑΧΛΑΔΙΑ:30
fenpyroximate ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΪΤ								+		ΜΗΛΙΑ	1	7
flonicamid ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ			+							*	3	21
tau - fluvalinate ΤΑΟΥ - ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	+		+	+			+			*	2	90
phosmet ΦΟΣΜΕΤ	+	+		+	+		+			*	1	28
chloranthraniliprole ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	+						+			*	2	14
chlorpyrifos ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ	+	+	+		+		+		+	*	2	30
chlorpyrifos-methyl ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ	+	+	+	+	+					*	1	21

* Έγκριση και σε Μηλιά και σε Αχλαδιά

** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή με spinosad μετά από εφαρμογή για ψύλλα 14 ημ., για άλλα έντομα 7 ημ. .

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε σχολαστικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας.

Ηράκλειο Απρίλιος 2013