



No 18 / 3 Ιουνίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΜΠΕΛΙ**A. ΕΥΔΕΜΙΔΑ (*Lobesia botrana* Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae)**

- Η 2^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Αμπελώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής	Αμπελώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων (προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 %ο ζάχαρης)	11-14 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	21-24 Ιουνίου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	7-10 Ιουνίου και επανάληψη μετά από 14 ημέρες	18-21 Ιουνίου	Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαση των ωών	11-14 Ιουνίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	21-24 Ιουνίου	Alpha-cypermethrin (2), Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), (1), Deltamethrin (2), Esfenvalerate (2), Lambda cyhalothrin (2), Pyrethrins (3), Spinosad (3)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.
- Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).

B. ΩΙΔΙΟ (*Uncinula necator* Schwein Burrill)

- Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη μετά την καρπόδεση και οι συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Azoxystrobin, Boscalid, Bupirimate, Copper oxychloride + Sulphur, Cyproconazole, Dimethomorph, Fenbuconazole, Kresoxim-methyl, Laminarin, Metrafenone, Myclobutanil, Penconazole, Propineb, Proquinazid, Pyraclostrobin, Sulphur, Tebuconazole, Tetraconazole, Triadimenol, Trifloxystrobin.

Γ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (*Plasmopara viticola* Berk. & Curt., Berl. & De Toni)

- Να επιθεωρείτε τακτικά τους αμπελώνες και μόλις διαπιστωθούν κηλίδες λαδιού ή επάνθιση στα φύλλα να γίνει επέμβαση.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Azoxystrobin, Benalaxyl-M, Calcium copper sulfate, Copper hydroxide, Copper oxychloride, Cymoxanil, Dimethomorph, Dithianon, Famoxadone, Fenamidone, Folpet, Fosetyl aluminium, Iprovalicarb, Mancozeb, Mandipropamid, Maneb, Metalaxyl, Propineb, Pyraclostrobin, Triadimenol, Tribasic copper sulfate, Zoxamide.
- Με κατάλληλη επιλογή ΦΠΠ μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονη καταπολέμηση Περονόσπορου και Ωιδίου.

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη