

**№ 11 / 24 Απριλίου 2013**Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****ΕΛΙΑ****A. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (*Prays oleae* Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae)**

- Η πτήση των ενήλικων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση εναντίον των προνυμφών που προσβάλουν τα άνθη, αφού ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική καρπώδεση.
- Συνιστάται επέμβαση μόνο σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές **8-10 Μαΐου** και για τις όψιμες-ορεινές περιοχές **18-20 Μαΐου**.
- Συνιστάται η χρήση βιολογικών σκευασμάτων με *Bacillus thuringiensis* και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 % ζάχαρης για προστασία των φυσικών εχθρών.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: *Bacillus thuringiensis*, Beta-cyfluthrin, Chlorpyrifos-methyl, Deltamethrin, Diflubenzuron, Lambda cyhalothrin.
- Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας (*Palpita unionalis* Hübner, Lepidoptera: Pyralidae).

B. ΑΚΑΡΕΑ ERIOPHYIDAE (*Aceria oleae*, *Oxycenus maxwelli*, *Tegolophus hassani*, *Ditrimacus athiasellus*)

- Ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των ακάρεων από τις θέσεις διαχείμασης στις νέο-σχηματιζόμενες ταξιανθίες. Κατάλληλος χρόνος επέμβασης από την παραλαβή του δελτίου έως το στάδιο E (διαχωρισμός του τσαμπιού, αρχίζουν να φαίνονται τα κοτσάνια των μπουμπουκιών).
- Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βρέξιμο θείο, αφού οι κανονισμοί το επιτρέπουν.

Γ. ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΚΑΛΟΚΟΡΗ (*Saissetia oleae*, *Aspidiotus nerii*, *Parlatoria oleae*, *Pollinia pollini*, *Calocoris trivialis*)

- Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για κοκκοειδή/βαμβακάδα και τινάγματα κλάδων 50-60εκ. για την καλόκορη.
- Εάν διαπιστωθεί σοβαρή προσβολή κοκκοειδών ή βαμβακάδας ή παρουσία περισσότερων των 6 ατόμων καλόκορης/κλαδίσκο μήκους 50-60εκ., συνιστάται επέμβαση με θερινό λάδι.
- Το θερινό λάδι έχει επίδραση και στα ακάρεα *Eriophyidae*.
- Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδεμα του εσωτερικού μέρους της κόμης των δένδρων (κλαδοκάθαρος) για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, ισορροπημένη λίπανση.

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**