

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Εντομοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ													ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Ακάρεια	Άσπρη ψώρα	Βαμβακάδα	Δάκος	Θρίπτες	Κοκκοειδή	Λεκάριο	Μυτλόμορφη ψώρα	Παρλατόρια	Πολλίνα	Μαργαρόνια	Πυρηνωτήρη	Ρυγχίτης	
paraffin oil	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				21
Dimethoate				✓										28
Alpha-cypermethrin				✓										7(Δολωματικός)
Beauveria bassiana				✓										Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Beta-cyfluthrin				✓								✓		14 (Δολωματικός ψεκασμός) & 56 ημέρες με ψεκασμό κάλυψης
Deltamethrin			✓	✓	✓		✓					✓		7
Lambda cyhalothrin				✓									✓	7ή 14 ή 120 (ανάλογα με το σκεύασμα και τον τρόπο ψεκασμού)
Pyrethrins				✓									✓	2
Spinosad				✓										14 (Δολ. Ψεκασμός)
Thiacloprid Triacloprid+deltametrin				✓									✓	14
Bacill us thuringiensis (ανθόβια γενιά)													✓	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Chlorpyrifos-methyl							✓						✓	60
Diflubenzuron													✓	στην αρχή της άνθησης
Fenoxycarb							✓							60
Pyriproxyfen (Δευτερεύουσα δράση στην ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ)							✓		✓					Δεν ορίζεται λόγω του συσιστώμενου χρόνου εφαρμογής (πριν την άνθιση)
urea				✓										εντομοελκυστικά
hydrolysed proteins				✓										εντομοελκυστικά

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στις ετικέτες των σκευασμάτων

Καβάλα 17/03/2014