



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

16/01-04-13

## ΜΗΛΙΑ

### 1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

#### ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Γ



Γ<sub>3</sub>



Δ



Δ<sub>3</sub>



Ε



Ε<sub>2</sub>

#### Διαπιστώσεις:

Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν με την εμφάνισή της (**βλαστικό στάδιο Γ-Γ<sub>3</sub> – πράσινη κορυφή**) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. **Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.**

#### Οδηγίες:

Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες στο στάδιο της πράσινης κορυφής (Γ-Γ<sub>3</sub>).

#### Φυτ/κά

#### προϊόντα:

Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.

## 2.ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η pronύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

#### Οδηγίες:

**Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασμός όταν τα δένδρα φτάσουν στα βλαστικά στάδια Γ<sub>3</sub> έως Ε<sub>2</sub>.**

#### Φυτ/κά

#### προϊόντα:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός



### **3.ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ**

#### **Οδηγίες:**

Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές φυτείες) να γίνει ψεκασμός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

*Θερινά λάδια, Φοσμέτ, χλωρπυριφός.*

### **4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ**

#### **Οδηγίες:**

Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει άμεσα επέμβαση εναντίον των χειμερινών αυγών με Κλοφεντεζίν + θερινά λάδια.

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

β) στα βλαστικά στάδια E-E2 με <sup>ή</sup> *Εξιθιαζόξ*, αν δεν έχει προηγηθεί η επέμβαση με *Κλοφεντεζίν*.

γ) στην πλήρη πτώση των πετάλων με <sup>ή</sup> *Ετοξαζόλ*, ή *Μιλμπεμεκτίν* εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία επέμβαση από τις προηγούμενες.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**