

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Ωίδιο.** Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Μπορεί να γίνει σύγχυση με τις κηλίδες περονόσπορου, οι οποίες όμως με υγρασία στο σκοτάδι και σε θερμοκρασίες δωματίου δίνουν υποχρεωτικά εξανθήσεις την επόμενη μέρα **μόνο** στην κάτω πλευρά του φύλλου.



**Ωίδιο.** Κηλίδες όπως φαίνονται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου που δεν έχουν σπόρια (χνούδι). Σε αντίθεση με τον περονόσπορο εάν μπουν στο σκοτάδι με υγρασία δεν παράγουν σπόρια.



**Ωίδιο.** Γκριζόλευκο χνούδι συνήθως στην κάτω αλλά και στην **πάνω** πλευρά του φύλλου. Είναι τα σπόρια της ασθένειας και εμφανίζονται στη σκιά με υγρασία.



**Ωίδιο.** Προσβολές στα άνθη και εμφάνιση γκριζόλευκου χνούδιού.

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

7.

|   |   |
|---|---|
| <b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ :</b><br>( <i>Lobesia botrana</i> )<br><br>Οδηγίες: | Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η δεύτερη πτήση και διαπιστώνονται οι πρώτες ωοτοκίες.<br><br>Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:<br><b>- Πρώιμες περιοχές</b> (όπως <i>Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, περιοχή Τομπακίου, κλπ</i> )<br>Επιτραπέζια: <b>22 - 23 Μαΐου.</b><br>Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: <b>26 - 27 Μαΐου.</b><br><b>- Ενδιάμεση ζώνη</b> (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης όπως <i>Καλέσα, Βασιλειές, Βούτες, Βάθεια, Καταριανά, Μοίρες, κλπ</i> )<br>Επιτραπέζια: <b>24 - 25 Μαΐου.</b><br>Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: <b>28 - 29 Μαΐου.</b><br><br>Για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο. |
| <b>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ :</b><br>( <i>Planococcus ficus</i> )            | Σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση, των πρώιμων και ενδιάμεσων περιοχών, που διαπιστώνονται πληθυσμοί και δεν έχει γίνει ακόμα επέμβαση μπορεί να γίνει συνδυασμένη με την ευδεμίδα. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνεται <b>καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.</b>   |
| <b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ :</b><br>( <i>Empoasca spp</i> )                  | Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ΩΙΔΙΟ:</b><br><i>(Erysiphe necator)</i><br><i>Οδηγίες:</i> | Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και νέοι κύκλοι του παθογόνου εξαπλώνουν περαιτέρω την ασθένεια.<br>Υπενθυμίζεται ότι από την άνθηση μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα. |
| <b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b><br><i>(Plasmopara viticola)</i>          | Η εκδήλωση της ασθένειας είναι πολύ περιορισμένη.<br>Να γίνεται καταπολέμηση <b>μόνο</b> όπου εμφανίζονται συμπτώματα.   |

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

*Ηράκλειο 20 Μαΐου 2013*

*Ο Προϊστάμενος Δ/νσης*

*Τρουλλάκης Γιάννης*