

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Σακκούλη, Κ. Ρήγας

ΑΜΠ: 7/18-7-13

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:



Πηγή: utopia.duth.gr
Προσβολή από Ευδεμίδα



πηγή: bayercropscience.gr
Ευδεμίδα στο αμπέλι

Διαπιστώσεις: Άρχισε η γ' πτήση του εντόμου στις πρώιμες περιοχές και εντός των ημερών αναμένεται και στις όψιμες.

Οι συλλήψεις στις παγίδες είναι χαμηλές έως μέτριες.

Συστάσεις: Μπορείτε να επέμβετε στις παρακάτω ημερομηνίες.

Πρώιμες περιοχές: 21 - 24 Ιουλίου

Όψιμες περιοχές: 25 - 28 Ιουλίου

με ρυθμιστές ανάπτυξης

ή

Πρώιμες περιοχές: 25 - 28 Ιουλίου

Όψιμες περιοχές: 29 - 1 Αυγούστου

με λοιπά εντομοκτόνα.

Στις πρώιμες ποικιλίες που πλησιάζει η συγκομιδή να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα επιτραπέζια σταφύλια και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από τη β' γενεά της Ευδεμίδας.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια για καλύτερη καταπολέμηση της Ευδεμίδας και προστασία των ωφέλιμων εντόμων.

Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 12 – 15 ημέρες.

ΩΙΔΙΟ:

Διαπιστώσεις: Σε ορισμένες περιοχές έχουν διαπιστωθεί προσβολές.

Συστάσεις: **Στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο του γυαλίσματος δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος προσβολής.**

Στις υπόλοιπες, να συνεχισθεί η προστασία.

Για την τελευταία επέμβαση για το Ωίδιο πριν το γυάλισμα να προτιμούνται τα μυκητοκτόνα επαφής.

Προσοχή στο σκόνισμα με θειάφι, γιατί με τις υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ:

Διαπιστώσεις: Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν δεν ευνοούν προσβολές. Όμως στα σταφύλια που έχουν ζημιωθεί από Ευδεμίδα, Ωίδιο, χαλάζι κλπ. μπορεί να προκληθούν μολύνσεις από Βοτρύτη.

Συστάσεις: **Στα αμπέλια που παρατηρούνται συνήθως προσβολές από την ασθένεια (βαριά εδάφη, ποτιστικά αμπέλια, ευαίσθητες ποικιλίες), να γίνει στην αρχή του γυαλίσματος συνδυασμένη καταπολέμηση Ευδεμίδας και Βοτρύτη.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων και ιδιαίτερα τα όρια των ημερών πριν τη συγκομιδή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ