

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkrfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Κ.Ρήγας, Ε. Σακκούλη

ΜΗΛ: 6/1-8-13

ΑΧΛΑΔΙΑ - ΜΗΛΙΑ

Ημιορεινές και ορεινές περιοχές

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΨΥΛΛΑ - ΛΙΘΟΚΟΛΛΕΤΗΣ - ΣΕΣΙΑ:

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η β' πτήση της Καρπόκαψας με χαμηλό πληθυσμό. Άρχισε η γ' πτήση του Λιθοκολλέτη, οι συλλήψεις της Σέσιας είναι μειωμένες και οι προσβολές της Ψύλλας εμφανίζονται περιορισμένες.

Συστάσεις: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση των εντόμων στις μηλιές και αχλαδιές 9 - 11 Αυγούστου.

Φάρμακα: Στη λίστα των εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί.

ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ (ΜΠΙΤΤΕΡ ΠΙΤ):

Είναι φυσιολογική ανωμαλία που προκαλεί στα μήλα κηλίδες επιφανειακές η λίγο βαθύτερες, που σταδιακά γίνονται καφέ. Τα συμπτώματα αυτά παρατηρούνται κυρίως κατά τη διατήρηση των μήλων στο ψυγείο. Κύρια αιτία θεωρείται η έλλειψη ασβεστίου στον καρπό, που ευνοείται από υπερβολική αζωτούχο λίπανση, μικρή καρποφορία και ακανόνιστα ποτίσματα.

Συστάσεις: Στα δένδροκομεία μηλιάς που εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα την προηγούμενη χρονιά και έχουν περιορισμένη παραγωγή, χρειάζεται να γίνει αυτή την εποχή ψεκάσμος με χλωριούχο ή νιτρικό ασβέστιο και να επαναληφθεί μετά 15 ημέρες.

- Πρέπει να γίνει πλήρης διαβροχή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό.
- Όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πικρής κηλίδωσης στα μήλα μπορεί να γίνει και τρίτος ψεκάσμος κοντά στην ημερομηνία συλλογής των μήλων.
- Να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση που προκαλεί τη δημιουργία ζωηρής βλάστησης.
- Να αποφεύγονται τα ακανόνιστα ποτίσματα.

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ