

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ-Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : ΤΕΡΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 651 10 Τ.Θ.: 1235

Τηλέφωνο : 2510 600421

Fax: 2510 600430

Email : pkrfpeka@otenet.gr

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

Σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

ΕΛΙΑ

No 21/14-06-2017

Βλαστικό στάδιο



Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται σε βλαστικό στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος πάνω από 3 χιλιοστά.



Πυρηνοτρήτης

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου έχει ξεκινήσει στις πρώιμες και στις όψιμες περιοχές. Στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 – 5 χιλιοστά πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από περίπου 15 ημέρες.

Παρλατόρια

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν έγινε καταπολέμηση της παρλατόριας προανθικά με εντομοκτόνο (ρυθμιστής ανάπτυξης), δεν απαιτείται ψεκασμός.

Ακάρεα

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες και όπου δεν έγινε αποτελεσματική καταπολέμηση θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση των ακάρεων.

♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



Η Προϊσταμένη Τμήματος

κ.α.α.

Ζωή Αδαμίδου