




# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**40/10-7-17**

## Α.ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

### 1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές με αραιές συλλήψεις..

**Οδηγίες-  
Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

**1. Αμεσα με:** *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ (14 ημ.),*

*Ντιφλουμπενζουρόν(30 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.), Χλωραντраниλιπρόλ (14 ημ.).*

**2.Μέχρι 13 Ιουλίου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες(**3 &1 ημ. ανάλογα με το σκεύασμα**), *Βάκιλλος Θουριγγίας* (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία **0 ημ.**), *Μεθοξυφenoζάντ (14 ημ.)*, *Τεμπουφenoζάντ (14 ημ.)*.

**3.Από 14 ως 17 Ιουλίου με**

*Δελταμεθρίν (7 ημ.)*, *Θιακλοπρίντ (14 ημ.)*, *Ιντοξακάρμπ (10 ημ.)*, *{Εμαμεκτίν μπενζοείτ-3 ημ.-μόνο στη μηλιά}*, *{Ετοφενπρόξ 7 ημ.-μόνο στη μηλιά}*, *Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.)*, *Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.)*, *Σπινοσάντ (14 ημ.)*, *Σπινετοράμ (7 ημ)*, *Τ-Φλουβαλινείτ (30 ημ.)*, *Φοσμέτ(28 ημ.)*, *Χλωπυριφός μεθύλ (21 ημ.)*.

**Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:**

**1. Μέχρι 13 Ιουλίου με:** Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

**2.Από 14 ως 17 Ιουλίου με:**

*Δελταμεθρίν, Χλωπυριφός, Χλωπυριφός μεθύλ.*

## 2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

**Οδηγίες:** Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Νάρκη:***Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοσάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλωραντраниλιπρόλ.*

**Σέσια:** *Μπέτα συφλουθρίν.*



### **3.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ**

**Οδηγίες:** Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

**Φυτ/κά Προϊόντα:** *Αλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2) , Αμπαμεκτίν+Χλωραντράνιλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2),Μπιφεναζίτ (1) Σπιροντκλοφέν (1) Τεμπουφενπιράντ(1).*

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

### **4. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ- ΩΪΔΙΟ**

**Οδηγίες:** Να συνεχιστεί η προστασία σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από φουζικλάδιο. Για το ωΐδιο να γίνονται συχνοί έλεγχοι για την έγκαιρη επέμβαση όπου απαιτείται.

### **Β. ΚΑΡΥΔΙΑ**

#### **1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ**

**Οδηγίες:** **Στις καρυδιές των ώσιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:**

**1. Μέχρι 13 Ιουλίου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

**2.Από 14 ως 17 Ιουλίου με:**

*Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.*

### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**