

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Δελτίο Ν^ο1

(Φουζικλάδιο - Ωίδιο - Βακτηριακό κάψιμο)

(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΛΙΒΑΔΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΔΑΜΑΣΤΑ)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Έκπτυξη ματιών
(C3 - D)



Πράσινη κορυφή
(D - E)



Λευκή κορυφή
(E - E2)



Έναρξη άνθησης
(F)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Φούσκωμα ματιών
(B - C)



Έκπτυξη ματιών
(C3 - D)



Πράσινη κορυφή
(D3 - E)



Ρόδινη κορυφή
(E - E2)

Τα βλαστικά στάδια ποικίλουν ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή. Στο Λιβάδι του Κρουσώνα η βλάστηση είναι πιο προχωρημένη σε σχέση με το οροπέδιο Λασιθίου.

Γενικά, στις ορεινές περιοχές, συνυπάρχουν τα παρακάτω βλαστικά στάδια :

- Στις μηλιές : φούσκωμα ματιών - έκπτυξη ματιών - πράσινη κορυφή - ρόδινη κορυφή.
- Στις αχλαδιές : πράσινη κορυφή - λευκή κορυφή - έναρξη άνθησης - άνθηση.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Τα ευαίσθητα στάδια για μόλυνση ξεκινούν με την έκπτυξη της βλάστησης (από τα στάδια C - C3 στη μηλιά και από τα C3 - D στην αχλαδιά).

- Οι καιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει από την έκπτυξη της βλάστησης έως σήμερα δεν έχουν ευνοήσει την ασθένεια.

Οδηγίες :

- Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτογενείς μολύνσεις απαιτούν βροχές (στις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο στις ορεινές περιοχές χρειάζονται τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόμενης διύγρανσης των δέντρων).

- Στις αχλαδιές να δίνεται προσοχή και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές (ακόμα και αν δεν υπάρχει βροχή).

- Εφόσον υπάρξει ανάγκη προστασίας (πρόβλεψη βροχής) συνιστάται προληπτική εφαρμογή πριν από την βροχή. Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν δυνατό και οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για μολύνσεις προτείνεται θεραπευτική εφαρμογή το συντομότερο μετά από την βροχή.

ΩΙΔΙΟ :

(Μηλιά)
(*Oidium farinosum*)



Γενικές πληροφορίες :

- Το μόλυσμα υπάρχει μέσα στα μάτια και δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης.

- Οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα.

- Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη όλη την καλλιεργητική περίοδο ενώ οι καρποί προσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο.

Οδηγίες :

Στις μηλιές συνιστάται έναρξη προστασίας από το στάδιο της πράσινης κορυφής (D3 - E). Εφόσον οι συνθήκες ευνοούν και το φουζικλάδιο μπορεί να γίνει συνδυασμένη προστασία.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :

(*Erwinia amylovora*)
(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Το βακτήριο προκαλεί ζημιές κυρίως στις αχλαδιές.

- Ευνοείται με ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και μεταφέρεται κυρίως με τον άνεμο, τα έντομα και τα εργαλεία.

- Η ποικιλία κρουστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.

Οδηγίες :

Στην διάρκεια της ανθοφορίας και μέχρι την πτώση των πετάλων:
Προληπτικοί ψεκασμοί στις αχλαδιές εφόσον επικρατούν ή προβλέπονται ευνοϊκές συνθήκες.

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



**Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις!
Σεβόμαστε τις μέλισσες!**

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας της μηλιάς και της αχλαδιάς:

- Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί παρουσία των μελισσών.
- Η παρουσία των μελισσών είναι έντονη κατά τη διάρκεια της ημέρας σε θερμοκρασίες πάνω από 13°C, σε ηλιόλουστη μέρα και σε χαμηλής έντασης άνεμο.
- Εάν κρίνεται απαραίτητη η φυτοπροστασία της καλλιέργειας, καλό είναι να γίνεται κοντά στο ηλιοβασίλεμα.

*Ηράκλειο 22 Μαρτίου 2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη*