



№ 13 / 29 Απριλίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία

ΠΕΛΙΝΕΣ-ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (*Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 1^η πτήση που θα δώσει την 1^η γενιά.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής	Οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	7-10 Μαΐου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	19-22 Μαΐου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	1-6 Μαΐου και επανάληψη μετά από 14 ημέρες	12-15 Μαΐου	Chlorantraniliprole (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	7-10 Μαΐου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	19-22 Μαΐου	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Indoxacarb (3), Spinosad (3)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε σύστημα παρεμπόδισης συζεύξεων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα με την παραλαβή του Δελτίου.
- Η επέμβαση για την Ανάρσια καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορούκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae). Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες.

Β. ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Tortricidae)

- Ξεκίνησε η 1^η πτήση που θα δώσει την 1^η γενιά.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής	Οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προσβολής	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	14-17 Μαΐου		Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	3-7 Μαΐου και επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες	10-13 Μαΐου	Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	8-10 Μαΐου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	14-17 Μαΐου	Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (2), Etofenprox (2), Lambda cyhalothrin (2)

Προσοχή, εάν γίνει προσεκτική επιλογή ΦΠΠ και χρόνου επέμβασης, μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονη καταπολέμηση Ανάρσιας και Φυλλοδέτη.

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη