



No 26 / 2 Μαΐου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ*(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)*

- Ξεκίνησε η 1^η πτήση του εντόμου. Η έναρξη των ωτοκίων υπολογίζεται από τις 3 Μαΐου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 9 Μαΐου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	11-14 Μαΐου	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	9-11 Μαΐου*	Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	11-14 Μαΐου	Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (1), Etofenprox (2), Lambda cyhalothrin (2)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- *Οι προτεινόμενες ημερομηνίες υπολογίστηκαν με την προϋπόθεση ότι έγινε επέμβαση για την Ανάρσια, όπως προτάθηκε στο δελτίο νο 20-17/4. Σε περίπτωση που δεν έγινε η επέμβαση για την Ανάρσια, οι ημερομηνίες για την καταπολέμηση του Φυλλοδέτη να μετατεθούν 3 ημέρες νωρίτερα.
- Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια (*Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαφα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη