



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

18/4-5-17

ΕΛΙΑ

1. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Η ανθοφορία είναι πλούσια σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Καταπολέμηση συνιστάται μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (30-40% της κανονικής) και εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές προσβολές. Όπου κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση, να γίνει στο κρόκιασμα (στάδιο F).

Φυτ/κά

προϊόντα:

Bacillus thuringiensis - Ενδείκνυται και για βιολογικές καλλιέργειες. Η επέμβαση να γίνει όταν έχει ανοίξει το 5% των ανθέων και να επαναληφθεί σε 7-10 ημέρες. **Ειδικά στις βιολογικές καλλιέργειες ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη κρίνεται αναγκαίος, σε κτήματα που παρουσιάζεται προσβολή, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με σκευάσματα του Βάκιλλου δεν είναι αποτελεσματική.**
Δελταμεθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Φοσμέτ Χλωρπυριφός μεθύλ.

2. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες:

Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30% προσβεβλημένες ταξιανθίες).

Φυτ/κά

προϊόντα:

Δελταμεθρίν, Θερινά λάδια. Να χρησιμοποιηθεί μαζί με το εντομοκτόνο και διαβρεκτικό, ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να διαπερνά τα κηρώδη νημάτια και να βρίσκει τις νύμφες.

3. ΑΚΑΡΕΑ

Προσβάλλουν τους βλαστούς και τα φύλλα που εμφανίζουν παραμορφώσεις, και προκαλούν πτώση των ανθέων και των καρπών, αφού ο σχηματισμός των ταξιανθιών συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή τους πυκνότητα.

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς ελαιώνες. Ο βαθμός προσβολής

ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την περιοχή.

Οδηγίες:

Για την αντιμετώπιση τους, σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές (5-10 άτομα ανά ταξιανθία), να γίνει επέμβαση πριν την ανθοφορία (κλειστή ταξιανθία).

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινά λάδια.

4.ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ)

Διαπιστώσεις:

Από επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών.

Οδηγίες:

Σε επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς να γίνει επέμβαση από 8-12 Μαΐου.

Να γίνει προσεκτικός και επιμελημένος ψεκασμός. Σε περιπτώσεις μεγάλων προσβολών να γίνει επανάληψη του ψεκασμού μετά από δύο εβδομάδες.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινά λάδια, {*Σπιροτετραμάτ* μετά την άνθηση} .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (**www.minagric.gr**)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & Α.Α

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ