



No 28 / 5 Μαΐου 2014

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ****A. ΩΙΔΙΟ (*Podosphaera leucotricha* Ell. and Ev. Salm.)**

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
- Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Boscalid, Bupirimate, Captan, Cyflufenamid, Dithianon, Fluopyram, Fluquinconazole, Folpet, Kresoxim-methyl, Myclobutanil, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Sulphur, Tebuconazole, Triadimenol, Trifloxystrobin.
- Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το Φουζικλάδι.

B. ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (*Cacopsylla* sp., Homoptera: Psyllidae)

- Παρατηρήθηκαν ήδη τα πρώτα τέλεια έντομα της ανοιζιάτικης πτήσης καθώς και οι πρώτες ωοτοκίες.
- Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις κορυφές των βλαστών της χρονιάς (30-50 εκ.) του οπωρώνα επιλέγοντας 20 τυχαία δέντρα και ένα βλαστό σε κάθε δέντρο σε ύψος 1 έως 2 μέτρα.
- Όσοι παραγωγοί ακολούθησαν τις οδηγίες του Δελτίου Νο 10/27-03-14 συνιστάται να διενεργήσουν οποσδήποτε δειγματοληπτικό έλεγχο για να διαπιστώσουν εάν χρειάζεται δεύτερη εφαρμογή/επανάληψη της επέμβασης.
- Εάν διαπιστωθεί παρουσία περισσότερων των 4 προנוμφών στους 20 βλαστούς (εικόνα 1), να γίνει επέμβαση στις 6-9 Μαΐου, με επανάληψη ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- Εάν διαπιστωθεί παρουσία έως 4 προνομφών στους 20 βλαστούς, να προστεθεί θερινό λάδι στην επέμβαση για την καρπόκαμα (αναμείνате επόμενο δελτίο).
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Abamectin + παραφινικό λάδι, Beta-cyfluthrin, Chlorpyrifos-methyl, Cyfluthrin, Deltamethrin, Diflubenzuron, Fatty acid potassium salt, Fenoxycarb, Imidacloprid, Lambda cyhalothrin, Paraffin oil, Phosmet, Spinosad, tau-Fluvalinate.



ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia funebrana* Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η 1^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένες δραστικές ουσίες όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:
 - Diflubenzuron **6-9 Μαΐου**.
 - Chlorpyrifos, Deltamethrin **11-13 Μαΐου**.



Εικόνα 1. Προνύμφες *Cacopsylla pyri* (φωτογραφία Α. Υφούλης)

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη