



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

### Πολλές ευχές για την καινούργια χρονιά

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

4 / 4-2-13

#### ΜΗΛΟΕΙΔΗ

##### 1. Βακτηριακό κάψιμο

Η μεταφορά του Βακτηρίου γίνεται με έντομα (κυρίως μέλισσες), με το νερό της βροχής και με τα εργαλεία του κλαδέματος.

**Οδηγίες:** Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

- ✓ Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
- ✓ Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων καθ'όλη τη βλαστική περίοδο με αφαίρεση και υγιούς τμήματος.
- ✓ Κατά το κλάδεμα ή τον καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς, με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5%, ή λυζόλης 3%.
- ✓ Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.
- ✓ **Ψεκάσμος πριν τη διακοπή του λήθαργου με πυκνό χαλκούχο διάλυμα κατά προτίμηση Βορδιγάλειο πολτό 3,5%(δηλαδή 3,5-3,5-100/ χαλκός-ασβέστης- νερό).**

##### 2. Φουζικλάδιο – Εξέγκωση

- Οδηγίες:**
- ✓ Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους μύκητες που προσβάλλουν τα μηλοειδή).
  - ✓ Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι καλό για τη μείωση του μολύσματος του φουζικλαδίου, τα πεσμένα φύλλα να μαζεύονται και, ή να παραχώνονται (όπου είναι εφικτό), ή να ψεκάζονται με ουρία που βοηθά στην αποσύνθεσή τους (μετά την πτώση).
  - ✓ Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και να μειώνεται η υγρασία. ►

- ✓ Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της εξέλκωσης).
- ✓ Ισορροπημένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο.

### **3. Κόκκινος Τετρανύχος**

**Οδηγίες:** Η επέμβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Ο ψεκασμός για να είναι αποτελεσματικός, απαιτείται καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων, προς τη νότια κυρίως πλευρά .

**Να χρησιμοποιηθούν παραφινέλαια, ορυκτέλαια .**

**Σημείωση:** Με τον ψεκασμό αυτόν αντιμετωπίζονται, οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα.

**Ειδικά για την Αιματόψειρα, όπου υπάρχουν προσβολές, χρειάζεται καλό λούσιμο της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.**

### **4. Ψύλλα Αχλαδιάς**

Πρωτεύοντα ρόλο στη σωστή αντιμετώπιση του εντόμου έχει η **αποτελεσματική καταπολέμηση των πληθυσμών της διαχειμάζουσας γενιάς.**

**Διαπιστώσεις:** Από παρατηρήσεις μας, διαπιστώθηκε η έξοδος των ενήλικων ατόμων.

**Οδηγίες:** Στους οπωρώνες που πέρσι υπήρξαν προσβολές από το έντομο, να γίνει ψεκασμός ως εξής:

**ΦΥΤ/ΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:** 1. Άμεσα με χρήση πυρεθρινών εναντίον του ενήλικου πληθυσμού ή χρήση *καολίνη* που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών των θηλυκών.

ή

2. Λίγο αργότερα - **και οπωσδήποτε πριν το φούσκωμα των ματιών βλαστικό στάδιο Γ** - χρησιμοποιώντας θεινικό πολτό σε συνδυασμό με πυρεθρίνες, με σκοπό και τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.

Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε μέρα ηλιόλουστη και ζεστή, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα και εφ' όσον η μέγιστη θερμοκρασία για 2-3 ημέρες ξεπερνά τους 10 °C.

**Σημειώσεις:** Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
(Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**

