



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

23/19-5-17

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις-Οδηγίες: Λόγω των καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών ο κίνδυνος μόλυνσεων είναι μεγάλος. Χρόνος επώασης 9-12 ημέρες. Άμεση επέμβαση στους οπωρώνες μηλοειδών σε όλες τις περιοχές. Σε κτήματα που υπάρχουν ήδη προσβολές, να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά προϊόντα: **A. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, Μανκοζέμπ (όχι σε Golden), Μετιράμ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση, Προπινέμπ.

B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Bacillus subtilis strain QST 713, Θειοφανείτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Potassium phosphonates, Ντιφενοκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ, Ντιθιανόν+Πυριμεθανίλ Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ+ Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ.

2. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Οδηγίες-Φυτ/κά προϊόντα: Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η βροχόπτωση καθυστέρησαν την εξέλιξη του εντόμου. Όσοι επέλεξαν την χρήση κλασικών εντομοκτόνων για την καταπολέμηση της καρπόκαψας, η επέμβαση να γίνει από 23-26 Μάη.

Μηλιά – Αχλαδιά: Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα σφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Κυδωνιά: Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στους οπωρώνες αχλαδιάς των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει άμεσα επαναληπτική επέμβαση .

3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες-Φυτ/κά προϊόντα: Στις καρυδιές των πρώιμων περιοχών να γίνει άμεσα επαναληπτική επέμβαση. Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 23-26 Μάη με: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ