

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 16

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε όψιμες περιοχές.




Ωίδιο: Σταθερή παρουσία. Ανάγκη συνδυασμένων επεμβάσεων με την ευδεμίδα.

Περονόσπορος: Δυσμενείς συνθήκες. Περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με πρωινές δροσιές.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiolini			
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών - κατακόρυφη θέση		Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών
		Πρώιμη ζώνη		κλείσιμο σταφυλιών
		Μεσοπρώιμη	τα σταφύλια κλείνουν	
Όψιμη ζώνη	ανάπτυξη ρωγών-κατακόρυφη θέση			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις όψιμες περιοχές συνεχίζει να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα (συλλήψεις, ωτοκίες).
- Στις υπόλοιπες περιοχές οι συλλήψεις σταδιακά μειώνονται, οι ωτοκίες αραιώνουν και επιπλέον οι καιρικές συνθήκες των ημερών (υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία) περιορίζουν την δραστηριότητα του εντόμου.

Οδηγίες :

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Όψιμες περιοχές	• Επιτραπέζια : 3 - 4 Ιουλίου
-----------------	-------------------------------

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Ενημέρωση. Η γενιά που πέρασε εμφάνισε δυναμικούς πληθυσμούς και έκανε ζημιές. Μια καινούρια γενιά αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο δεκαήμερο πρώτα από τις πρώιμες - παραλιακές περιοχές. Οι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Για την εξέλιξη της και τον χρόνο καταπολέμησης θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)



ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Εμφανίζεται παντού. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν την περίοδο αυτή καθυλώνουν προσωρινά μόνο την ασθένεια.

Οδηγίες :

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή σχετική υγρασία που επικρατούν την περίοδο αυτή δεν ευνοούν την εξάπλωση του μύκητα.



Οδηγίες :

- Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί.

Τα αμπέλια πρέπει να προστατεύονται **μόνο** στις θέσεις που συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές και υπάρχει η ασθένεια.

Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το ωίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Καταγράφονται ολοένα και πιο δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια (τέλεια, νύμφες) και εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα. <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ</p>
<p>ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ: (<i>Planococcus ficus</i>)</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή). <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να ελέγχονται τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά με ιστορικό προσβολών. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών βοηθά στον εντοπισμό του. - Σε επιτραπέζια σταφύλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνει επιμελημένος ψεκασμός. Η αντιμετώπιση του εντόμου μετά το κλείσιμο των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ</p>

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη