



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

43/30-7-14

1. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ(ΑΧΛΑΔΙΑ)

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος για τα αχλάδια των όλων των περιοχών.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις αχλαδιές όλων των περιοχών. Η προστασία να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.**

Φυτοπρ/κά προϊόντα: Παγίδες προσέλευσης-θανάτωσης με *Δελταμεθρίν* ή ψεκασμός με *Δελταμεθρίν (7 μέρες)*.

ΜΗΛΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς.

Οδηγίες: Σε μηλιές των ορεινών περιοχών να γίνει επέμβαση από 3-7 Αυγούστου.

Φυτ/κά προϊόντα: Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν μπενζορέιτ, Ετοφενπρόξ, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Φυτ/κά προϊόντα: **Νάρκη:** *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν, Τ-φλουβαλινέιτ, Φενοξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλωραντраниλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*
Σέσια: *Χλωρπυριφός.*



3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που διαπιστώνετε ενεργές κηλίδες του μύκητα, να συνεχιστεί η προστασία.

4. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ (ΜΗΛΙΑ)

Είναι μη παρασιτική ασθένεια που οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η έλλειψη ασβεστίου στους καρπούς προέρχεται από τον ανταγωνισμό κυρίως αζώτου, καλίου, μαγνησίου. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.

Οδηγίες:

Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνισης της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.

Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών αυξάνεται, αν συγχρόνως αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές.**
- 2. Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των ομάδων των δραστικών ουσιών για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ