

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΤΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°3

- Ωίδιο:** Ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.
Περουόσπορος: Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.
Ευδεμίδα: Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.
Τζιτζικάκι: Πρώτες μετακινήσεις. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας την περίοδο αυτή	Κλίμακα Baggiolini			
		Στάδιο Ε Πρώτα φύλλα	Στάδιο F Εμφάνιση σταφυλιού	Στάδιο G Εσχώρισμα σταφυλιού
		Πρώιμη ζώνη		Επικρατεί το G
		Μεσοπρώιμη	Από F έως G με επικρατέστερο το G	
Οψιμη ζώνη	Επικρατούν τα στάδια E και F			

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία της Υπηρεσίας (Πιν.2) και με το [Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών](#) ο φετινός μήνας Μάρτιος εμφανίζεται από τους ξηρότερους των τελευταίων ετών.

Πιν.2. Βροχομετρικά στοιχεία (ύψος σε χιλ.) μηνός Μαρτίου ετών 2009 - 2018

ΠΕΡΙΟΧΗ \ ΕΤΟΣ	ΕΤΟΣ										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	43	9	71	74	29	105	122	88	128	23	
ΑΣΗΜΙ	6	4	66	42	23	74	89	47	88	24	
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ	48	22	57	52	29	8	220	34	91	26	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	20	33	49	78	17	87	55	30	86	4	
ΑΡΧΑΝΕΣ	23	29	62	84	14	104	61	35	97	16	
ΒΙΑΝΝΟΣ	27	6	38	45	24	81	60	42	121	13	

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)

(χολέρα, σίρικας)



Πρώιμη προσβολή
(βλαστοί - σημαίες)

Γενικές πληροφορίες :

Οι πρώιμες προσβολές (σύμπτωμα βλαστοί - σημαίες) έχουν εμφανιστεί από τις αρχές του Απριλίου σε αμπέλια της πρώιμης ζώνης. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί παρότι υπάρχουν σε μικρό ποσοστό (μόλις 2-3 ‰), διατηρούν το μόλυσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και το διασπείρουν σε όλο το αμπέλι.

Οδηγίες :

Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Ανάγκη άμεσης επέμβασης έχουν τα αμπέλια που δεν έχει γίνει ακόμα ψεκασμός.

Οι μολυσμένοι βλαστοί που τυχόν γίνονται αντιληπτοί, να αφαιρούνται και να απομακρύνονται από τα αμπέλια κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(*Plasmopara viticola*)



Κηλίδες λαδιού



Χιονώδεις εξανθήσεις

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Η παρατεταμένη ανομβρία και οι λιγοστές χαμηλού ύψους βροχές που έχουν σημειωθεί από την έναρξη της βλάστησης δεν έχουν ευνοήσει την ασθένεια. Μόνο στις περιοχές όπου σημειώθηκαν βροχές ύψους 10 χιλ. και άνω, την 7^η Απριλίου (ν.Ρεθύμνου και ν.Χανίων), υπάρχει μικρή πιθανότητα εμφάνισης κηλίδων μετά τα μέσα του Απριλίου.

Οδηγίες :

1. **Να μην γίνονται άσκοποι ψεκασμοί.**
2. **Στις τοποθεσίες όπου σημειώθηκαν οι βροχές** (κυρίως στους ν.Ρεθύμνου και Χανίων) να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας, να γίνεται άμεσα ψεκασμός και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πτήση έχει ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου στις πρωιμότερες περιοχές και σταδιακά μέχρι τις αρχές Απριλίου εμφανίστηκε και στις οψιμότερες περιοχές. Στην ανθόβια γενιά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στις ανθοταξίες της ελιάς και οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.

Οδηγίες :

Δεν συνιστάται αντιμετώπιση. Για την προστασία από την ανθόβια γενιά, μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες που καρποδένουν πριν τη σουλτανίνα, (prime, superior, ralli κλπ.) θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:

(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι πρώτες μετακινήσεις (πτερωτά άτομα) έχουν παρατηρηθεί σε αμπέλια που βρίσκονται από την παραλιακή έως και την μεσοπρώιμη ζώνη, σε θέσεις κοντά σε άλλους ξενιστές του εντόμου όπως καλαμιές, βάτα κλπ.

Οδηγίες :

Δεν συστήνεται ψεκασμός. Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νόμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

*Ηράκλειο 12 Απριλίου 2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη*