

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής, Ρ. Οικονομάκη

5.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Σ. Λούρου.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ :

Μεσοπρώιμες περιοχές: «Κρόκιασμα» των ανθιδίων στις ταξιανθίες, λίγο πριν την άνθηση (στάδιο E).

Όψιμες περιοχές: Συνεχίζεται το φούσκωμα των ανθοταξιών (στάδιο D).

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέικη)



Στάδια D & E: Φούσκωμα και κρόκιασμα μαζί στην ταξιανθία.



Στάδιο E: Κρόκιασμα.



Στάδιο F: Έναρξη άνθησης



Στάδιο F1: Πλήρης άνθηση.



Πυρηνωτήτης: Προσβολή σε κλειστό άνθος.



Βαμβακάδα: Λευκά κηρώδη εκκρίματα στις ταξιανθίες.

Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ

<p>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (<i>Prays oleae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p> <p>Σύσταση:</p> <p>Ενημέρωση:</p>	<p>Στις <u>μεσοπρώιμες</u> περιοχές η <u>ανθόβια γενιά</u> βρίσκεται σε εξέλιξη.</p> <p>– Σε ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν <u>χρειάζεται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς.</u></p> <p>– <u>Ελαιώνες μέτριας ή μειωμένης ανθοφορίας</u> (<50% της κανονικής) έχουν ανάγκη προστασίας <u>κατά την έναρξη της άνθησης</u> (από το κρόκισμα έως 25% ανοικτών ανθέων).</p> <p>– Σε ελαιώνες <u>βιολογικής γεωργίας</u> η αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας για να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς (καρπόβιας). Συστήνεται επανάληψη της επέμβασης σε 7 ημέρες.</p> <p>Για τις <u>όψιμες</u> περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p> <p><u>Περίοδος άνθοφορίας:</u> <i>Bacillus thuringiensis</i>, <i>Beta cyfluthrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Lambda cyhalothrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), <i>Dimethoate</i> (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ.), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ.), <i>Chlorpyrifos methyl</i> (2 εφαρμογές, αναμονή 60).</p> <p>Κατά τη διάρκεια της άνθησης προτείνεται η χρήση <u>μικροβιακών σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας</u> που δεν διαταράσσουν τα έντομα επικονίασης και τα ωφέλιμα (παράσιτα, αρπακτικά).</p> <p>Για τις Π.Ε. <u>Χανίων και Λασιθίου</u> τα δεδομένα των συλλήψεων του εντόμου λαμβάνονται με την συνεργασία της ΔΑΟΚ Χανίων και της Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραιμβέλλου Α.Ε.</p>
<p>Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α : (ΨΥΛΛΑ) (<i>Euphyllura phyllireae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p>	<p>Η νεαρή βλάστηση και οι ταξιανθίες καλύπτονται με χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και μελιτώματα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ψύλλας με αποτέλεσμα να παρατηρούνται <u>κατά περιοχές εξάρσεις προσβολών.</u></p> <p>– Συστήνεται αντιμετώπιση σε <u>ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και προσβολή που εξαπλώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% των ανθέων.</u></p> <p>Επιλέγοντας εγκεκριμένο σκεύασμα και προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.</p> <p><u>Παραφινικά λάδια</u> (1-4 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 21μ.), <u>Άλατα λιπαρών οξέων</u> (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή/ αναμονή 7 ημ.).</p>
<p>Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (<i>Palpita unionalis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:</p>	<p>Αυτή την περίοδο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση. Οι προνύμφες προκαλούν εκτεταμένα φαγώματα και στοές στα φύλλα και στις βλαστικές κορυφές.</p> <p>– Στις <u>μεσοπρώιμες</u> περιοχές συστήνεται προστασία των <u>νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.</u></p> <p><u>Περίοδος άνθοφορίας:</u> <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ.).</p>

▪ Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίστε να τηρούνται αυστηρά για να αποφεύγετε κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ηράκλειο 18 Απριλίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, κ.ά).