



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

31/1-6-17

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις μεσοπρώιμες περιοχές (Καλέτζι Στιμάγγα, Κούτσι, κλπ.)

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές και στις επιτραπέζιες ποικιλίες των όψιμων περιοχών, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά **Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ.**

προϊόντα: **Β. Μέχρι τις 3 Ιουνίου με:**

Μεθοξυφenoζάντ, Τεμπουφenoζάντ, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ, Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες.

Γ. Από 3 ως 6 Ιουνίου με:

Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Σπινετοράμ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες των όψιμων περιοχών όπου κρίνετε απαραίτητη η επέμβαση για την ευδεμίδα, να γίνει από 5 ως 8 Ιουνίου με δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στην Τρίτη επιλογή.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες: Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή (κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα και πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμηγκία). Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, **να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.**

Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου και καλό είναι να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός – μεθύλ. ►

3.ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ

Οδηγίες: Όπου μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά Άλατα (Κ) λιπαρών οξέων, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ,

προϊόντα: Λάμπντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν.

4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις-Οδηγίες: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές (Νεμέα, Σπαθοβούνι). Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τον μύκητα.

Εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών και άμεση επέμβαση.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Βλέπε δελτίο Βλέπε δελτίο 24/19-5-17.

5. ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Τα αμπέλια βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές και πρέπει να είναι προστατευμένα. Η επέμβαση να είναι σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 24/19-5-17.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
4. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ