

## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ  
Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)

ΑΧΑΪΑΣ  
ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΕΛ: 3/15-4-13


### ΕΛΙΑ



Δ



Ε



Ζ

Φαινολογικά  
στάδια: **Πρώιμες περιοχές:** Στάδιο Ζ (κρόκισμα-αρχή άνθησης)  
**Μεσοπρώιμες περιοχές:** Στάδιο Ε (διαχωρισμός του μούρου)  
**Όψιμες περιοχές:** Στάδια Δ-Ε (φούσκωμα και διαχωρισμός του μούρου)

#### ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:

Ζημιές: Το έντομο γεννάει τα αυγά του στα ανθοφόρα μπουμπούκια όταν αυτά βρίσκονται στα στάδια Ε και Ζ. Οι προνύμφες τρώνε τα όργανα του άνθους, με αποτέλεσμα τα άνθη να ξεραίνονται και να παραμένουν στην ανθοταξία ενωμένα με νήματα.

Διαπιστώσεις: Η πτήση του εντόμου έχει ξεκινήσει και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι υψηλές.

Συστάσεις: **Καταπολέμηση της ανθόβιας γενεάς του Πυρηνοτρήτη δικαιολογείται μόνο σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία, εκεί που γίνονται συνήθως προσβολές από το έντομο καθώς επίσης και σε νεαρά δενδρύλλια.**

Χρόνος  
ψεκασμού: Η κατάλληλη περίοδος εφόσον κρίνεται αναγκαία η καταπολέμηση, είναι όταν τα δένδρα βρίσκονται στις αρχές έως το 50% της άνθησης (στάδιο Ζ).

#### ΑΣΠΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΨΩΡΑ (ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ):

Ζημιές: Όταν η προσβολή είναι έντονη, καρποί, φύλλα και κλαδίσκοι καλύπτονται από ένα συνεχές στρώμα ασπιδίων. Οι ζημιές είναι σημαντικότερες στις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς, διότι λόγω των κηλίδων, οι καρποί χάνουν την εμπορική τους αξία.

Διαπιστώσεις: Σε ορισμένες περιοχές (κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία) διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα από προσβολές του κοκκοειδούς στις βρώσιμες ελιές (Καλαμών).

Συστάσεις: **Συνιστάται άμεσος ψεκασμός στους ελαιώνες που έχουν διαπιστωθεί προσβολές. Για αποφυγή καταστροφής των ωφέλιμων εντόμων καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται για ψεκασμό εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας όπως είναι οι θερινοί πολτοί.**

**Γενικές οδηγίες για μείωση πληθυσμού του εντόμου.**

- να αποφεύγεται το υπερβολικό πότισμα.
- να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχα λίπανση.
- να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα για τη μείωση των προσβολών.
- να γίνονται ψεκασμοί μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητοι και καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας ώστε να μην καταστρέφονται τα ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά.

**ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ):**

Διαπιστώσεις: Οι προσβολές είναι περιοδικές και σποραδικές.

**ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ:**

Διαπιστώσεις: Το έντομο κάνει την εμφάνισή του Απρίλιο με Μάιο και αρχίζει να τρέφεται με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς και ανθοταξίες.

Συστάσεις: **Ψεκασμός για Ψύλλα και Μαργαρόνια μόνο στους ελαιώνες που διαπιστώνονται προσβολές, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του Πυρηνοτήτη.**

Φάρμακα: ***Στις λίστες των φαρμάκων που έχουν αποσταλεί.***

**ΣΗΜ:** Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ  
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ