



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

20/10-5-17

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέχρι 14 Μαΐου με: *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φενοξυκάρμπ, Χλωραντраниλιπρόλ.*

2. Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Βάκιλλος Θουριγγίας* (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), *Μεθοξυφenoζάντ, Τεμπουφenoζάντ.*

3. Από 19 ως 22 Μάη με:

Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 19 ως 22 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Νάρκη: *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξικάρμπ, Φοσμέτ, Χλωραντраниλιπρόλ.*

Σέσια: *Μπέτα συφλουθρίν.*

3. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα. ▶

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Αλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Λάμπντα Συαλοθρίν, Πιριμικάρμπ, Σπιροτετραμάτ, Τ-φλουβαλινείτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

**Φυτ/κά
Προϊόντα:**

Αλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτί(2), Αμπαμεκτί+Χλωραντраниλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Beauveria bassiana ATCC 74040 (5), Εξιθιαζόξ (1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτί(2), Μπιφенаζέιτ (1) Σπιροντικλοφέν (1) Συφλουμετοφέν (2), Τεμπουφενπυράντ(1), Φενπυροξιμέιτ (1).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

5. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Να συνεχιστεί η προστασία. Να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα που καταπολεμά και το ωίδιο

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 13/31-3-17.

6. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες:

Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 15 μέχρι τις 18 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ίος τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 19 ως 22 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ