



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

7 / 13-02-13

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



Γ
Ροζ κορυφή



Δ
Λευκή κορυφή



Ε
Οι στήμονες
διακρίνονται



Ζ
Άνθη ανοιχτά



Η
Πτώση των πετάλων

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες, με την λήψη του δελτίου. Στις όψιμες ποικιλίες, η επέμβαση να γίνει όταν φτάσουν στο βλαστικό στάδιο Γ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα για την μονιλία.

Βλέπε δελτίο 6/ 6-2-13.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι η προσβολή των οφθαλμών, των φύλλων και των καρπών.

Συμπτώματα: Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

Οδηγίες: Να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

**ΦΥΤ/ΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Θιράμ, Κάπταν, Μανέμπ, Ντιθιανόν.



Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια και οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα.

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες.** Σας θυμίζουμε ότι σε όλη την διάρκεια της άνθησης, τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 6/ 6-2-13.

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: **Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε όλες τις ποικιλίες. Να προσεχτούν ιδιαίτερα οπωρώνες με ιστορικό προσβολών τα προηγούμενα χρόνια.**

Σας επισημαίνουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ' αυτή την περίοδο.

Φυτ/κά προϊόντα: **Στις όψιμες ποικιλίες και όψιμες περιοχές και οπωσδήποτε πριν την διόγκωση των οφθαλμών:** *Κάπταν, Ντιθιανόν, Βορδιγάλειος πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού.*

Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα να γίνει δέκα τουλάχιστον μέρες μετά το κλάδεμα, για να αποφευχθούν τοξικότητες σε περίπτωση παγετού.

Σε όλες τις ποικιλίες των πρώιμων περιοχών και στις πρώιμες ποικιλίες των όψιμων περιοχών: *Ζιράμ {ροδακινιά}, Θιράμ {ροδακινιά, δαμασκηνιά}.*

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες: **Σε κτήματα που δεν έγινε φθινοπωρινή επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα, συνιστάται ψεκασμός μέχρι το στάδιο Γ (χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια χαλκούχου σκευάσματος) για προστασία από τις παραπάνω ασθένειες.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ