

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν°10

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Καταπολέμηση σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές καθώς και σε πρώιμες ΠΕ Χανίων.*




Περουόσπορος: Αύξηση προσβολών.

Ωίδιο: Κρίσιμη περίοδος. Διαρκής προστασία.


Τζιτζικάκι: Πρώτες εμφανίσεις. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

*Σε συνεργασία με την Δ.Α.Ο.Κ. και οινοποιεία του νομού Χανίων.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggjolini			
		Στάδιο Ι Άνθηση	Στάδιο J Καρπόδεση	Στάδιο Κ Ράγες σε ανάπτυξη
		Πρώιμη ζώνη		Ράγες σε ανάπτυξη
		Μεσοπρώιμη	Επικρατεί η καρπόδεση	
Οψιμη ζώνη	Επικρατεί η άνθηση			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις πρώιμες περιοχές καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και πυκνές ωτοκίες.
- Στις μεσοπρώιμες περιοχές καταγράφονται έναρξη πτήσης της νέας γενιάς και οι πρώτες αραιές ωτοκίες.
- Στις πρώιμες περιοχές της ΠΕ Χανίων καταγράφεται αύξηση πληθυσμών τις τελευταίες ημέρες.

Οδηγίες :

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμες (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 2 - 3 Ιουνίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 3 - 5 Ιουνίου

Μεσοπρώιμες	• Επιτραπέζια : 2 - 4 Ιουνίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 5 - 7 Ιουνίου

Πρώιμες ΠΕ Χανίων	• 2 - 4 Ιουνίου
--------------------------	------------------------

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε αμπέλια που εμφανίζονται φαινόμενα παρατεταμένης άνθησης - ανισορραγίας τροποποιείται η επιδεκτικότητα των σταφυλιών άρα και ο χρόνος επέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία καταπολέμησης να μετατεθεί 2 - 3 ημέρες.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Σε πολλές τοποθεσίες (οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες) διαπιστώνονται προσβολές χαμηλής έντασης που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούνται.

Οδηγίες :

- Να γίνεται επανάληψη της επέμβασης σε αμπέλια που ο χρόνος δράσης του προηγούμενου ψεκασμού έχει λήξει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι έντονες προσβολές που εμφανίζονται μετά τα μέσα Ιουνίου προέρχονται από μολύνσεις που γίνονται την περίοδο αυτή.
- Ο μύκητας αναπαράγει συνεχώς μολύσματα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (άνθηση - καρπόδεση - νεαρές ρώγες) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οδηγίες :

- Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή.
- Οι καιρικές συνθήκες που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες (ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες) επιτρέπουν την εφαρμογή και ευνοούν την καλή δράση του θείου σε σκόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Υπάρχουν αμπέλια με αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου και παρατηρούνται οι πρώτες άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου (η καταπολέμηση στοχεύει αυτό το στάδιο).

Οδηγίες :

- Να ενταθούν οι συστηματικοί έλεγχοι (όριο επέμβασης 50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, στην κάτω πλευρά τους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 1 Ιουνίου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη