



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**12 / 10-4-18**

### ΑΜΠΕΛΙ

#### 1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

##### Οδηγίες:

##### Καλλιεργητικά μέτρα:

- Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος. Οι νεαρές κληματίδες που έρχονται την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
- Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
- Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές.
- Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.
- Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση.

##### Χημική αντιμετώπιση

**Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.)**

**Ο ψεκασμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή αν δεν καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και επικρατήσουν κατόπιν ευνοϊκές συνθήκες για τον μύκητα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία της ασθένειας αργότερα ( Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου). Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).**

##### Φυτ/κά προϊόντα:

*Αζοξυστρομπίν, Αμετοκτραντίν+Μετιράμ,  
Αμετοκτραντίν+Ντιμεθομόρφ, Ιπροβαλικάρμπ+ Προπινέμπ,  
Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ-  
μ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ,  
Μαντιπροπαμίντ+χαλκός, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ,  
Μαντιπροπαμίντ+ Ζοξαμίντ, Μπεναλαξύλ+Μανκοζέμπ,*

*Μπενελαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μετιράμ, Μπενθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ+Μανκοζέμπ, Ντιμεθομόρφ + Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ + Φολπέτ, Ντιθιανόν, Ποτάσιουμ Φοσφονείτς, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+ Φοσετύλ-αλ, Συμοξανίλ+Ζοξαμίντ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ, Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, Φολπέτ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Φολπέτ+Μεταλαξύλ+Χαλκός, Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ, Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Ιπροβαλικάρμπ, Χαλκός+Ζοξαμίντ, Χαλκός+Ντιμεθομόρφ.*

## **2.ΩΙΔΙΟ** **Οδηγίες:**

### **Συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.**

Στην εμφάνιση των ανθοταξιών (μήκος βλάστησης 8-15 εκ.), το αμπέλι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μολύνσεις του μύκητα και ο ρυθμός επιμήκυνσης της νέας βλάστησης είναι μεγάλος. Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες (δύο φορές την εβδομάδα) για την ύπαρξη προσβολών, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια και στις ευαίσθητες ποικιλίες.

Οι προσβεβλημένοι βλαστοί να μαζεύονται, να καταστρέφονται και να ακολουθεί άμεσα προληπτική επέμβαση με κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

## **Φυτ/κά** **προϊόντα:**

**Βλέπε προηγούμενο δελτίο 9/19-3-18.**

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. **Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. **Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.**
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**