

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Σακκούλη, Κ. Ρήγας

ΕΛ: 7/8-10-13

ΕΛΙΑ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ:

Συμπτώματα: Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται κυκλικές κηλίδες χρώματος καφεκίτρινου και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

Συστάσεις: Σε περιοχές με πολύ έντονο πρόβλημα συνιστάται να γίνει και δεύτερος φθινοπωρινός ψεκασμός, ένα μήνα περίπου μετά τον πρώτο (βλ. ΕΛ: 6/16-9-2013).

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ Ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ:



Προσβολή από Καρκίνωση (φωτ. Ε. Σακκούλη)

Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που προκαλεί την εμφάνιση καρκινωμάτων στους νεαρούς βλαστούς και κλάδους.

Συμπτώματα: Οι προσβολές ευνοούνται από βροχερό καιρό και κυρίως όταν υπάρχουν καρκινώματα ή πρόσφατες πληγές στα δένδρα.

- Συνθήκες μόλυνσης:
Συστάσεις,
Φάρμακα:
- Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων.
 - Αποφυγή κλαδέματος με βροχερό ή υγρό καιρό.
 - Αποφυγή συλλογής του ελαιοκάρπου με ραβδισμό.
 - Ψεκασμός των δένδρων μετά από κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι με χαλκούχα σκευάσματα.

ΚΑΠΝΙΑ:

Η μαυρίλα που καλύπτει φύλλα, βλαστούς και κλάδους οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται επάνω σε μελιτώματα κοκκοειδών.

Συστάσεις,
Φάρμακα:

Πρωταρχική είναι η καταπολέμηση του Λεκάνιου ή άλλων κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή.

Τα χαλκούχα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το Κυκλοκόνιο ή την Καρκίνωση καταπολεμούν επίσης την Καπνιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται σχολαστικά τα όρια των ψεκασμών από τη συγκομιδή.

ΣΗΜ.: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

