



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

17/8-4-13

Α. ΑΧΛΑΔΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου δημιούργησε συνθήκες για ελαφριά ως μέτρια μόλυνση σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων 22 Απρίλη στις πρώιμες περιοχές και 26 Απρίλη στις όψιμες.

Οδηγίες: Επέμβαση στις αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση. Στις περιοχές που έπεσε χαλάζι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μίγμα προστατευτικού και θεραπευτικού σκευάσματος.

Φυτ/κά προϊόντα: **Α. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ (όχι σε κρυστάλλι και Κόσια), Μετιράμ (όχι σε Κόσια), Ντιθιανόν (έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν (έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση).
Β. Προστατευτική και θεραπευτική δράση: Θειοφανείτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο}, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Πυρακλοστρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τριφλοξιστρομπίν, Τριφλοξιστρομπίν+Κάπταν.

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

Οδηγίες: ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ συνεχείς επισκέψεις στα δενδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών. Τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού.

Β. ΜΗΛΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές οι μηλιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου δημιούργησε συνθήκες για ελαφριά ως μέτρια μόλυνση σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων στις 26 Απρίλη.

>

Οδηγίες: **Επέμβαση στις μηλιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.**

Φυτ/κά προϊόντα: **A. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ (όχι σε Golden) , Μετιράμ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση, Προπινέμπ.
B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση: Θειοφανείτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιφenoκoναζόλ, Πυριμεθανίλ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Συπροκoναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ.

Γ.ΚΕΡΑΣΙΑ – ΒΥΣΣΙΝΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.

Φυτ/κά προϊόντα: **Κερασιά:** Θιράμ, Θιοφανείτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν, Προχλοράζ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο).
Βυσσινιά: Θιοφανείτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο)
Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Στα μυκητοκτόνα για το φουζικλάδιο να γίνεται εναλλαγή των ομάδων των δραστικών ουσιών για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ