

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**
Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334
Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax : 24210 69545
e- mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες: Msc Ι. Παππά Δρ.Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 1 /19.02.2012

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ: Τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί κατά την περίοδο του ληθάργου των δένδρων και λίγο πριν το «φούσκωμα» των οφθαλμών, συνιστώνται για να μειωθούν οι αρχικοί πληθυσμοί εντόμων και ακάρεων και τα αρχικά μολύσματα μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους κατά την βλαστική περίοδο που ακολουθεί. Οι επεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Οι ήπιες έως τώρα καιρικές συνθήκες είχαν ως συνέπεια σε πολλές περιοχές, οι πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς και δαμασκηνιάς να έχουν ήδη εισέλθει στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών. Στις ποικιλίες αυτές οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Οι ξεροί ή προσβεβλημένοι κλάδοι, βλαστοί και καρποί θα πρέπει να απομακρυνθούν με κλάδεμα και να καούν. Το κλάδεμα πρέπει να γίνει με ξηρό καιρό, να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε διάλυμα φορμόλης του εμπορίου σε αναλογία 2% σε νερό ή διάλυμα χλωρίνης σε αναλογία 10% σε νερό. Στις μεγάλες τομές κλαδέματος θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα προστατευτικά σκευάσματα.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ, ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ Συνιστάται ψεκασμός των δένδρων με κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια με χαλκούχο ή άλλο μυκητοκτόνο (Πίνακας 1)

Κατάλληλο στάδιο εφαρμογής από τον λήθαργο έως την διόγκωση των οφθαλμών:
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ : Στάδιο Α,Β

ΚΟΡΥΝΕΟ Συνιστάται ψεκασμός των δένδρων με κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια, χαλκούχο ή άλλο μυκητοκτόνο. (Πίνακας 1)

Κατάλληλο στάδιο εφαρμογής από τον λήθαργο έως την ρόδινη ή λευκή κορυφή.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ , ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Στάδιο Β, C, D.

ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, Στάδιο Α,Β, C

ΜΟΝΙΛΙΑ Για την προστασία των καλλιεργειών συνιστώνται δύο ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια και το στάδιο βλάστησης, μυκητοκτόνα. (Πίνακας 1)

Ο πρώτος ψεκασμός θεωρείται απαραίτητος και πρέπει να πραγματοποιηθεί στο στάδιο της ρόδινης ή λευκής κορυφής.

ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Στάδιο C, D

ΑΣΠΡΗ ΨΩΡΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ) Συνιστάται ψεκασμός υψηλής πίεσης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια λάδι. Τα χειμερινά λάδια εφαρμόζονται μέχρι το φούσκωμα των ματιών ενώ τα θερινά εφαρμόζονται μέχρι το στάδιο της ρόδινης ή λευκής κορυφής. Η


επέμβαση αυτή καταπολεμά επίσης τις διαχειμάζουσες μορφές και άλλων φυτοφάγων εντόμων και ακάρεων.

- Οι προτεινόμενοι ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται με στεγνό καιρό.
- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.


Ο Προϊστάμενος Δ/σης α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτρης


ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ




ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ



ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ



ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013, ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ /ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | | | ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ | | |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | Εξώασκος | Κορύνεο | Μονίλια | Εξώασκος | Κορύνεο | Μονίλια |
| Calcium copper sulfate | * | * | * | * | * | * |
| Cooper oxide | * | * | * | * | * | * |
| Cooper hydroxide | * | * | * | | * | * |
| Cooper oxychloride | * | * | * | * | * | * |
| Dithianon | * | * | * | * | * | * |
| Thiram | * | | * | * | | * |
| Ziram | * | * | * | - | - | - |
| Tribasic cooper sulfate | | | * | | | * |
| Boscalid | | | * | | | * |
| Cyproconazole | | | * | | | |
| Iprodione | | | * | | | * |
| Propiconazole | | | * | | | * |
| Pyraclostrobin | | | * | | | * |
| Tebuconazole | | | * | | | |
| Captan ✧ | * | * | * | * | * | * |
| Maneb ✧ | | * | | | * | |

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ /ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ | | | ΚΕΡΑΣΙΑ | | |
|-----------------------------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | Εξώασκος | Κορύνεο | Μονίλια | Εξώασκος | Κορύνεο | Μονίλια |
| Calcium copper sulfate | * | * | * | * | * | * |
| Cooper oxide | * | * | * | * | * | * |
| Cooper hydroxide | * | * | * | * | * | * |
| Cooper oxychloride | * | * | * | * | * | * |
| Dithianon | * | * | * | * | * | * |
| Thiram | * | | * | * | | * |
| Tribasic cooper sulfate | | | * | | | * |
| Boscalid | | | * | | | * |
| Iprodione | | | * | | | |
| Pyraclostrobin | | | * | | | * |
| Captan ✧ | * | * | * | * | * | * |
| Maneb ✧ | | * | | | * | |

✧ Τα εμπορικά σκευάσματα με δραστική ουσία το Captan και το Maneb είναι σε φάση αξιολόγησης. Για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ : www.minagric.gr