



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629


- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

5/27-2-18

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ A. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια



B.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Βλαστικά στάδια



1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, νεφοσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5°C, είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις: Οι υπερπρώμες και πρώμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια.

Οδηγίες : **Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προηγήθηκαν, να γίνει άμεσα επέμβαση με την λήψη του δελτίου. Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης.**

**Φυτ/κά
προϊόντα :**

1.Βερικοκιά: *Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum d747, Θιράμ, Θείο, Θειοφανέιτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντίον, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μικλομπουτανίλ, Μανκοζέμπ, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, Τεμπουκοναζόλ Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, ζΧαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.* ►

2. Ροδακινιά: *Bacillus amyloliquefaciens* subsp *plantarum* d747, Ζιράμ, Θείο, Θειοφανέιτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μυκλομπουτανίλ Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιφενοκοναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65), Προπικοναζόλ, Προχλοράζ(μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Συπροκοναζόλ , Τεμπούκοναζόλ Τεμπούκοναζόλ+ Συπροντινίλ, Φενπυραζαμίν, Φλουοπυράμ+ Τεμπούκοναζόλ {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

3. Νεκταρινιά: *Bacillus amyloliquefaciens* subsp *plantarum* d747, Θειοφανέιτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ ,Ντιφενοκοναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65), Συπροντινίλ Προπικοναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεμπούκοναζόλ, Τεμπούκοναζόλ+ Συπροντινίλ, Φενπυραζαμίν,Φλουοπυράμ+ Τεμπούκοναζόλ , {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σε αυτή την περίοδο εφόσον οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7⁰ C.

- Φυτ/κά προϊόντα:** Οι δραστικές ουσίες για την μονίλια που προλαμβάνουν τις προσβολές από τον εξώασκο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
 - ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
 - ✓ Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού.
 - ✓ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ