



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

27 / 15-5-14

Α.ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

1. ΑΝΑΡΣΙΑ

Οι προνύμφη του εντόμου προσβάλλει βλαστούς και καρπούς της βερικοκιάς, ροδακινιάς νεκταρινιάς και δευτερευόντως της δαμασκηνιάς.

Διαπιστώσεις: Η πτήση της ανάρσιας βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές. Οι συλλήψεις είναι μέτριες.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες των παραπάνω πυρηνοκάρπων, των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών, να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου.**

Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 19-23 Μάη.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βερικοκιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ **7 μέρες**} , {Ιντοξακάρμπ **10 μέρες**}, {Θιαμεθοξάμ+Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωραντρανιλιπρόλ **14 μέρες**}.

Ροδακινιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Λάμντα Συαλοθρίν Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν **7 μέρες**}, {Ιντοξακάρμπ **10 μέρες**}, {Αμπαμεκτίν+ Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ+Χλωραντρανιλιπρόλ, Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ **14 μέρες**}, {Χλωρπυριφός μεθύλ **21 μέρες**}, {Χλωρπυριφός **20 μέρες**}, {Ντιφλουμπενζουρόν, **30 μέρες**}, {Τ-Φλουβαλινείτ **56 μέρες**}.

Νεκταρινιά: Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ +Χλωραντρανιλιπρόλ, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, ,Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Δαμασκηνιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

2. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 21 / 23-4-14 .



3.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Την περσινή χρονιά υπήρξαν σημαντικές προσβολές σε οπωρώνες όψιμων ποικιλιών, πρώιμων κυρίως περιοχών.

Οδηγίες: Στις υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες δεν απαιτείται επέμβαση (χαμηλοί πληθυσμοί του εντόμου). Στο σπάσιμο του χρώματος των καρπών να ξεκινήσει η καταπολέμηση στους οπωρώνες όψιμων ποικιλιών των παραπάνω πυρηνοκάρπων. (Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης από 20-25 Μάη).

Τρόποι επέμβασης:

1.Ψεκασμοί κάλυψης (συνδυασμένη καταπολέμηση με την ανάρσια).

2. Δολωματικοί ψεκασμοί: Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται συγκεντρωμένο με μορφή χονδρών σταγονιδίων **σε κλαδιά χωρίς καρπούς** και στη νοτιοδυτική πλευρά του δένδρου . Συνιστάται να ψεκάζεται και η τυχόν υπάρχουσα βλάστηση στην περιμετρο του κτήματος (θάμνοι, φράκτες).

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βερικοκιά: *Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν.*

Ροδακινιά: Τα βιολογικά σκευάσματα με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα *Bauveria bassiana*, *Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Συφλουθρίν* .

Νεκταρινιά: *Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Συφλουθρίν.*

Δαμασκηνιά: *Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν.*

B. ΚΕΡΑΣΙΑ

1.ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ(Σκουλήκι των κερασιών)

Οδηγίες : **Στις πρώιμες ποικιλίες να μην γίνει επέμβαση. Στις όψιμες ποικιλίες, να γίνει επέμβαση από 25-29 Μάη.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:** {Βιολογικό εντομοκτόνο με βάση σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana* 0 ημέρες},{*Δελταμεθρίν- 7 μέρες πριν τη συγκομιδή* }, {*Θιαμεθοξάμ-7 μέρες πριν τη συγκομιδή*}.

ΠΡΟΣΟΧΗ: **Οι μέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ