



No 23 / 17 Ιουλίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία**ΠΕΛΙΝΕΣ-ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****A. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)**

- Ξεκίνησε η 3^η πτήση του εντόμου. Η έναρξη των ωοτοκίων υπολογίζεται από τις 17 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 22 Ιουλίου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	22-24 Ιουλίου και δύο επαναλήψεις 30-31 Ιουλίου και 8-10 Αυγούστου	CpGV (9)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	17-21 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	22-24 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- * Έγκριση μόνο για μηλιά

B. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ, ΝΑΡΚΕΣ ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΙΩΝ**(*Phyllonorycter blancardella* και *Phyllonorycter corylifoliella*, Lepidoptera: Gracillariidae)**

- Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Acetamiprid, Beta-cyfluthrin,

Γ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (*Cydia funebrana* Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η πτήση των ενήλικων της 3^{ης} γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Συνιστάται επέμβαση με την παραλαβή του δελτίου (Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Diflubenzuron, Chlorpyrifos, Deltamethrin)

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ